

Anexo 3.02 - Relação das Espécies da Flora Registrada na Formação Pioneira com Influência Fluvial da Estação Ecológica da Ilha do Mel

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
ANNONACEAE <i>Annona glabra</i> L.	araticum	TR	AV
BIGNONIACEAE <i>Tabebuia cassinoides</i> (Lam.) DC.	caxeta	TR	AV
BLECHNACEAE <i>Blechnum serrulatum</i> Rich.	samambaia-do-brejo	TR	HB
BROMELIACEAE <i>Billbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	bromélia	EP	HB
COMBRETACEAE <i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F. Gaertn.	mangue-branco	TR	AV
CYPERACEAE <i>Cyperus ligularis</i> L.	--	TR	HB
<i>Fimbristylis diphylla</i> (Retz.) Vahl	--	TR	HB
DROSERACEAE <i>Drosera capillaris</i> Poir.	drósera	TR	HB
FABACEAE <i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	espinheira-santa	TR	AV
LENTIBULARIACEAE <i>Utricularia tricolor</i> A. St.-Hil.	boca-de-leão-do-brejo	AQ	HB
LYCOPODIACEAE <i>Lycopodiella andicola</i> B. Øllg.	--	TR	HB
<i>Pseudolycopodiella caroliniana</i> (L.) Holub	--	TR	HB
ORCHIDACEAE <i>Habenaria pleiophylla</i> Hoehne & Schltr.	orquídea-da-terra	TR	HB
OSMUNDACEAE <i>Osmunda cinnamomea</i> L.	samambaia	TR	HB
PLANTAGINACEAE <i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	bacopá	TR	HB
PRIMULACEAE <i>Rapanea intermedia</i> Mez	capororoca	TR	AV
TYPHACEAE <i>Typha domingensis</i> Pers.	taboa	TR	HB
URTICACEAE <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	TR	AV
XYRIDACEAE <i>Xyris jupicai</i> Rich.	sempre-viva	TR	HB
ZINGIBERACEAE <i>Hedychium coronarium</i> J. König	lírio-do-brejo	TR	HB

Legenda: Hábitat (AQ – Aquática, EP – Epífita, TR – Terrícola), Forma de Vida (AV – Arbórea, HB - Herbácea).