

Anexo 3.03 - Relação das Espécies da Flora Registrada na Formação Pioneira com Influência Fluviomarina da Estação Ecológica da Ilha do Mel

FAMÍLIA / ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
ACANTHACEAE			
<i>Avicennia schaueriana</i> Stapf & Leechm. ex Moldenke	mangue-preto, siriúba	TR	AV
BIGNONIACEAE			
<i>Tabebuia cassinoides</i> (Lam.) DC.	caxeta	TR	AV
BLECHNACEAE			
<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	samambaia-do-brejo	TR	HB
BROMELIACEAE			
<i>Billbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	bromélia	EP	HB
COMBRETACEAE			
<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F. Gaertn.	mangue-branco	TR	AV
CYPERACEAE			
<i>Fuirena robusta</i> Kunth	--	TR	HB
<i>Rhynchospora marisculus</i> Lindl. ex Nees	--	TR	HB
<i>Scirpus californicus</i> Steud.	--	TR	HB
<i>Scirpus maritimus</i> L.	--	TR	HB
FABACEAE			
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	marmeleiro	TR	AB
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	mulungu-do-litoral	TR	AV
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	espinheira-santa	TR	AV
MALPIGHIACEAE			
<i>Stigmaphyllon arenicola</i> C.E. Anderson	--	TR	AB
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> (Lam.) A. Juss.	--	TR	AB
MALVACEAE			
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	algodoeiro-da-praia	TR	AB
MYRTACEAE			
<i>Marlierea eugeniopsoides</i> (D. Legrand & Kausel) D. Legrand	guamirim	TR	AV
<i>Marlierea tomentosa</i> Cambess.	--	TR	AV
ONAGRACEAE			
<i>Ludwigia suffruticosa</i> Walter	--	TR	HB
POACEAE			
<i>Spartina alternifolia</i> Loisel.	capim-do-mangue	TR	HB
<i>Spartina spartinae</i> (Trin.) Merr. ex Hitchc.	capim-do-mangue	TR	HB
POLYPODIACEAE			
<i>Polypodium angustum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Liebm.	--	TR	HB
PTERIDACEAE			
<i>Acrostichum danaeifolium</i> Langsd. & Fisch.	--	TR	HB
RHIZOPHORACEAE			
<i>Rhizophora mangle</i> L.	mangue-vermelho	TR	AV
SOLANACEAE			
<i>Solanum</i> sp.	--	TR	AB
URTICACEAE			
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	TR	AV
XIMENIACEAE			
<i>Ximenia americana</i> L.	--	TR	AV

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita) e Forma de Vida (AV – Arbórea, HB - Herbácea).