

ANEXO 3.07 - Relação das Espécies da Flora Registrada na Estação Ecológica da Ilha do Mel (Paranaguá/PR, Brasil) com os Respectivos Usos, Forma de Vida e Distribuição

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME VULGAR	USOS	FORMA DE VIDA	DISTRIBUIÇÃO
ACANTHACEAE				
<i>Aphelandra liboniana</i> Linden ex Hook.f.	afelandra	OR	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Avicennia schaueriana</i> Staph & Leechm. ex Moldenke	mangue-manso	MD, ME	AV	APL
AMARANTHACEAE				
<i>Alternanthera</i> sp.	penicilina	ME	HB	--
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	erva-de-santa-maria	ME	HB	APL
AMARYLLIDACEAE				
<i>Furcraea gigantea</i> Vent.	pita	ME	AB	EXT
ANACARDIACEAE				
<i>Anacardium occidentale</i> L.	cajueiro	AL	AV	APL
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	AL, ME	AV	EXT
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira	ME, PE	AV	APL
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	cupiúva	ME, MD, PE	AV	APL
ANNONACEAE				
<i>Annona glabra</i> L.	araticum	PE	AV	APL
<i>Rollinia sericea</i> (R.E. Fr.) R.E. Fr.	piçama	AL	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
APIACEAE				
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	violinha	ME	HB	APL
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	salsa	ME	HB	EXT
AQUIFOLIACEAE				
<i>Ilex theizans</i> Mart. ex Reissek	caúna	MD	AV	APL
ARACEAE				
<i>Philodendron</i> sp.	cipó-imbé	AR, ME	TP	--
ARECACEAE				
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	AL, AR, ME	AV	APL
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmiteiro	AL, AR, ME	AV	APL
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guamiova	AR	AB	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	AR, AL, ME	AV	APL
ARISTOLOCHIACEAE				
<i>Aristolochia</i> sp.	cipó-milome	ME	TP	--
ASTERACEAE				
<i>Achyrocline satureioides</i> (Lam.) DC.	marcela	ME	HB	APL
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	cabiju	ME	HB	EXT
<i>Bidens pilosa</i> L.	pico-pico	ME, ML	HB	APL
<i>Centratherum punctatum</i> Cass.	perpétua	ME	HB	APL
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H. Rob.	erva-de-são-simão	ME	HB	APL
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	saguassaiá	ME	HB	APL
<i>Eupatorium betoniciforme</i> (DC.) Baker	charruá	ME	HB	EXT
<i>Mikania glomerata</i> Spreng.	guaco-verdadeiro	ME	TP	APL
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	foguetinho	ME	HB	APL
<i>Wedelia paludosa</i> DC.	arnica	ME	HB	APL
BEGONIACEAE				
<i>Begonia hirtella</i> Link	begônia	OR	HB	APL
<i>Begonia radicans</i> Vell.	begônia	OR	HB	APL

Legenda: Uso (AL – Alimentício, AR – Artesanal, ME – Medicinal, MI – Místico, ML – Melífera, MD – Madeireiro, PE – Artefatos de pesca, OR – Ornamental), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB - Herbácea, TP – Trepadeira), Distribuição (FOD_{ATLÂNTICA} – Exclusivo da Mata Atlântica, APL – Ampla distribuição; em dois ou mais biomas, EXT – Espécie exótica).

Fonte: Extraído de Lima (2005).

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME VULGAR	USOS	FORMA DE VIDA	DISTRIBUIÇÃO
BIGNONIACEAE <i>Jacaranda puberula</i> Cham.	caroba	AR, MD, ME	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Tabebuia cassinoides</i> (Lam.) DC.	caxeta	PE, ME, MD	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Tabebuia umbellata</i> (Sond.) Sandwith	ipê-amarelo	MD	AV	APL
BORAGINACEAE <i>Cordia verbenacea</i> DC.	erva-baleeira	ME	AV	APL
BRASSICACEAE <i>Lepidium virginicum</i> L.	sordinha	ME	HB	APL
BROMELIACEAE <i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. & Schult.f.	ananás-do-mato	AL	HB	APL
<i>Vriesea rodigasiana</i> E. Morren	caraguatá-vermelho	AR, ME, PE	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
BURSERACEAE <i>Protium kleinii</i> Cuatrec.	arméssica	ME, MD	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
CACTACEAE <i>Rhipsalis</i> sp.	cipó-chumbo	ME	HB	--
CALOPHYLLACEAE <i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	AR, MD, PE	AV	APL
CANNABACEAE <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	creundiúva	MD, ME	AV	APL
CAPRIFOLIACEAE <i>Sambucus</i> sp.	sabugueiro	ME	HB	--
CARICACEAE <i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	AL, ME	AB	DES
CHLORANTHACEAE <i>Hedyosmum brasiliense</i> Miq.	erva-cidreira	ME	AB	APL
CHRYSOBALANACEAE <i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	uvá	AR, MD	HB	APL
CLUSIACEAE <i>Garcinia Gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari	AL, MD, PE	AV	APL
COMMELINACEAE <i>Commelina</i> sp.	troperava	ME	HB	--
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C. Mikan	cana-ponga	ME	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
CONVOLVULACEAE <i>Ipomoea</i> sp.	batata-doce	AL, ME	HB	--
COSTACEAE <i>Costus</i> sp.	cana-do-brejo	ME	HB	--
CUCURBITACEAE <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	chuchu	AL, ME	TP	APL
DILLENIACEAE <i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	AR, ME, OR	TP	APL
<i>Doliocarpus schottianus</i> Eichler	cipó-canela-de-jacu	ME	TP	FOD _{ATLÂNTICA}
DIOSCOREACEAE <i>Dioscorea</i> sp.	cará-côco	AL	HB	--
ERICACEAE <i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meisn.	camarinha	AL	AB	APL
EUPHORBIACEAE <i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	tapiá	MD	AV	APL
<i>Manihot utilissima</i> Pohl	aipim	AL, ME	HB	APL

Legenda: Uso (AL – Alimentício, AR – Artesanal, ME – Medicinal, MI – Místico, ML – Melífera, MD – Madeireiro, PE – Artefatos de pesca, OR – Ornamental), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB - Herbácea, TP – Trepadeira), Distribuição (FOD_{ATLÂNTICA} – Exclusivo da Mata Atlântica, APL – Ampla distribuição; em dois ou mais biomas, EXT – Espécie exótica).

Fonte: Extraído de Lima (2005).

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME VULGAR	USOS	FORMA DE VIDA	DISTRIBUIÇÃO
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	tabocuva	MD, PE	AV	APL
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	pica-cu	ME, MD	AV	APL
FABACEAE				
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	lombrigueiro	MD, PE	AV	APL
<i>Bauhinia forficata</i> Link	pata-de-vaca	ME	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Desmodium incanum</i> DC.	erva-tostão	ME	HB	DE
<i>Inga luschnathiana</i> Benth.	ingá-branco	AL	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Machaerium uncinatum</i> (Vell.) Benth.	farinha-seca	MD	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Mimosa pudica</i> L.	dormideira	ME	HB	APL
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms	coronha	ME	AB	APL
<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb.	caquera	MD, OR	AV	EXT
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	fedegoso	ME	HB	APL
IRIDACEAE				
<i>Crocosmia crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	barareçô	ME	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Trimezia</i> sp.	jabutitana	ME	HB	--
LAMIACEAE				
<i>Melissa officinalis</i> L.	erva-cidreira	ME	HB	EXT
<i>Mentha</i> sp. 1	hortelã	AL, ME	HB	--
<i>Mentha</i> sp. 2	poejo	AL, ME	HB	--
<i>Ocimum selloi</i> Benth.	alfavaca	AL, ME	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo	ME	HB	EXT
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	alecrim	ME	HB	EXT
LYTHRACEAE				
<i>Cuphea mesostemon</i> Koehne	sete-sangrias	ME	HB	APL
MALVACEAE				
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	enviruçu	PE	AV	APL
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	uvira-do-mangue	AR	AB	EXT
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	sapateira	OR	AB	EXT
<i>Sida carpinifolia</i> L. f.	guanxuma	ME	HB	APL
<i>Sida rhombifolia</i> L.	mata-pasto	ME	HB	APL
<i>Theobroma cacao</i> L.	cacau	AL	AV	APL
MELASTOMATACEAE				
<i>Miconia cabussu</i> Hoehne	pixiricão	MD	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	MD, PE	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Miconia rigidiuscula</i> Cogn.	jacatirão	MD	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Ossaea</i> sp.	pixirica-miúda	ME	AB	--
<i>Tibouchina clavata</i> (Pers.) Wurdack	orelha-de-onça	OR	AB	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Tibouchina trichopoda</i> Baill.	jacatirão	MD, PE	AB	FOD _{ATLÂNTICA}
MELIACEAE				
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	cangerana	MD, PE	AV	APL
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	camboatá	MD	AV	APL
MENISPERMACEAE				
<i>Cissampelos pareira</i> L.	cipó-salsaparreira	ME	TP	APL
MORACEAE				
<i>Ficus organensis</i> Miq.	figueira-branca	AR, MD, ME	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
MUSACEAE				
<i>Musa</i> spp.	bananeira	AL, ME	AB	--

Legenda: Uso (AL – Alimentício, AR – Artesanal, ME – Medicinal, MI – Místico, ML – Melífera, MD – Madeireiro, PE – Artefatos de pesca, OR – Ornamental), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB - Herbácea, TP – Trepadeira), Distribuição (FOD_{ATLÂNTICA} – Exclusivo da Mata Atlântica, APL – Ampla distribuição; em dois ou mais biomas, EXT – Espécie exótica).

Fonte: Extraído de Lima (2005).

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME VULGAR	USOS	FORMA DE VIDA	DISTRIBUIÇÃO
MYRSINACEAE				
<i>Rapanea parvifolia</i> (A. DC.) Mez	capororoca	MD	AV	APL
MYRTACEAE				
<i>Blepharocalyx</i> sp.	murta	AL, MD, ME	AV	--
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	AL, ME	AV	APL
<i>Gomidesia fenzliana</i> O. Berg	rapa-goela	AL, MD, PE	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Gomidesia schaueriana</i> O. Berg	guamirim	AL, MD, PE	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Gomidesia spectabilis</i> (DC.) O. Berg	guamirim-vermelho	AL, MD, ME	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Marlierea tomentosa</i> Cambess.	guapurunga	AR, AL	AV	APL
<i>Myrcia glabra</i> (O. Berg) D. Legrand	guamirim-branco	MD	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuí	MD	AV	APL
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçazeiro	AL, ME, MD, ML, PE	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira-branca	AL, ME	AV	APL
NYCTAGINACEAE				
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	MD	AV	APL
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	bonina	ME	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
OCHNACEAE				
<i>Ouratea parviflora</i> Engl.	canela-de-veado	ME	AB	FOD _{ATLÂNTICA}
ORCHIDACEAE				
<i>Oncidium uniflorum</i> Booth ex Lindl.	oncidium	OR	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Vanilla chamissonis</i> Klotzsch	baunilha	AL, OR	HB	APL
PASSIFLORACEAE				
<i>Passiflora edulis</i> Sims	maracujá	AL, ME	TP	APL
<i>Passiflora</i> sp.	maracujá	AL, ME	TP	--
PENTAPHYLACACEAE				
<i>Ternstroemia brasiliensis</i>	pinta-noiva	ME	AV	APL
PHYLLANTHACEAE				
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão	urucurana	AR, MD, ME	AV	APL
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	quebra-pedra	ME	HB	APL
PHYTOLACCACEAE				
<i>Petiveria alliacea</i> L.	guiné	ME, MI	HB	APL
PIPERACEAE				
<i>Pothomorphe umbellata</i> (L.) Miq.	pariparoba	ME	AB	APL
PLANTAGINACEAE				
<i>Plantago catharinea</i> Decne.	tanchase	AL, ME	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
POACEAE				
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	capiá	AR, ME, MI	HB	APL
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	(Schult. & Schult. f.)	paineira	AR, OR	HB
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	capim-cidró	ME	HB	APL
POLYGALACEAE				
<i>Polygala paniculata</i> L.	vique	ME	HB	APL
POLYGONACEAE				
<i>Polygonum aff. paniculatum</i> Andrz.	erva-de-bicho	ME	HB	--
POLYPODIACEAE				
<i>Microgramma vacciniifolia</i> (Lang. & Fisch.) Copel.	erva-de-sabiá	ME	HP	APL
PTERIDACEAE				
<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link	samambaia-branca	ME	HB	APL

Legenda: Uso (AL – Alimentício, AR – Artesanal, ME – Medicinal, MI – Místico, ML – Melífera, MD – Madeireiro, PE – Artefatos de pesca, OR – Ornamental), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB - Herbácea, TP – Trepadeira), Distribuição (FOD_{ATLÂNTICA} – Exclusivo da Mata Atlântica, APL – Ampla distribuição; em dois ou mais biomas, EXT – Espécie exótica).

Fonte: Extraído de Lima (2005).

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME VULGAR	USOS	FORMA DE VIDA	DISTRIBUIÇÃO
RHIZOPHORACEAE <i>Rhizophora mangle</i> L.	canapuva	ME, MD, PE	AV	APL
ROSACEAE <i>Rubus rosifolius</i> Sm.	amora-de-espinho	AL, ME	HB	APL
RUBIACEAE <i>Borreria verticillata</i> (L.) G. Mey.	puaia	ME	HB	APL
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	AL, ME	AB	EXT
<i>Diodia radula</i> (Willd.) Cham. & Schilt.	erva-de-lagarto	ME	HB	APL
<i>Psychotria nuda</i> (Cham. & Schltd.) Wawra	pasto-de-anta	ME, OR	AB	FOD _{ATLÂNTICA}
RUTACEAE <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	laranjeira-mimosa	AL, ME	AB	EXT
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	ME	AV	APL
SAPINDACEAE <i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	cuvatã	MD	AV	APL
SAPOTACEAE <i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard	maçaranduba	AL, MD, ME	AV	FOD _{ATLÂNTICA}
<i>Pouteria beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	pau-de-macaco	MD	AV	APL
SMILACACEAE <i>Smilax</i> sp.	cipó-quina	ME	TP	--
THEACEAE <i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	jacareperama	MD	AV	APL
THELYPTERIDACEAE <i>Thelypteris decussata</i> var. <i>brasiliensis</i> (C. Chr.) A.R. Sm.	samambaia-miúda	ME	HB	FOD _{ATLÂNTICA}
THYMELAEACEAE <i>Daphnopsis</i> sp.	envira	AR	TP	--
TYPHACEAE <i>Typha domingensis</i> Pers.	taboa	AR	HB	APL
URTICACEAE <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúva-branca	AR, ME, PE	AV	APL
VERBENACEAE <i>Lantana camara</i> L.	cambará	ME	HB	APL
<i>Stachytarpheta</i> sp.	gervão	ME	HB	--
VITACEAE <i>Cissus</i> sp.	salsa-do-mato	ME	HB	--
ZINGIBERACEAE <i>Hedychium coronarium</i> J. König	canafístula	AR, ME, OR	HB	EXT

Legenda: Uso (AL – Alimentício, AR – Artesanal, ME – Medicinal, MI – Místico, ML – Melífera, MD – Madeireiro, PE – Artefatos de pesca, OR – Ornamental), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB - Herbácea, TP – Trepadeira), Distribuição (FOD_{ATLÂNTICA} – Exclusivo da Mata Atlântica, APL – Ampla distribuição; em dois ou mais biomas, EXT – Espécie exótica).

Fonte: Extraído de Lima (2005).