

ANEXO 7 - LISTA DE AVES REGISTRADAS PARA O PARQUE ESTADUAL DO CERRADO,
JAGUARIAÍVA/PARANÁ E REGIÕES ADJACENTES

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
ORDEM RHEIFORMES		
FAMÍLIA RHEIDAE		
<i>Rhea americana</i>	3	cp
ORDEM TINAMIFORMES		
FAMÍLIA TINAMIDAE		
<i>Tinamus solitarius</i> (macuco)	3	F, E
<i>Crypturellus obsoletus</i> (inhambu-guaçu)	2, 3, 4	F, C
<i>Crypturellus parvirostris</i> (inhambu-chororó)	1, 3, 4	C
<i>Crypturellus tataupa</i> (inhambu-chintã)	3, OR	C
<i>Rhynchotus rufescens</i> (perdiz)	1, 3, 4	cp
<i>Nothura minor</i> (buraqueira)	OR	C
<i>Taoniscus nanus</i> (inhambu-carapé)	OR	C
ORDEM CICONIFORMES		
FAMÍLIA ARDEIDAE		
<i>Casmerodius albus</i> (garça-branca-grande)	1	RL, E
<i>Egretta thula</i> (garça-branca-pequena)	2	RL, E
<i>Bubulcus ibis</i> (garça-vaqueira)	2	Cp, E
<i>Syrigma sibilatrix</i> (maria-faceira)	1	cp
<i>Butorides striatus</i> (socozinho)	2, OR	RL
FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE		
<i>Theristicus caudatus</i> (curicaca)	1, 3, 4	C, cp, Aa, E
FAMÍLIA CATHARTIDAE		
<i>Sarcorampus papa</i> (urubu-rei)	1	E
<i>Coragyps atratus</i> (urubu)	1, 3	E
<i>Cathartes aura</i> (urubu-de-cabeça-vermelha)	1,3, OR	Aa, cp
ORDEM ANSERIFORMES		
FAMÍLIA ANATIDAE		
<i>Dendrocygna viduata</i> (irerê)	2	E
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (ananaí)	1, 2	RL, E
<i>Mergus octosetaceus</i> (pato-mergulhão)	OR	RL
<i>Oxyyura dominica</i> (bico-roxo)	OR	RL
ORDEM FALCONIFORMES		
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE		
<i>Elanus leucurus</i> (gavião-peneira)	1, 3, 4	C, cp

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Elanoides forficatus</i> (gavião-tesoura)	1	
<i>Accipiter bicolor</i> (gavião-bombachinha-grande)	3, OR	E
<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (águia-chilena)	1, 3, 4	
<i>Buteo albicaudatus</i> (gavião-de-rabo-branco)	1, 3, 4	F, C
<i>Buteo albonotatus</i> (gavião-urubu)	4	E
<i>Buteo brachyurus</i> (gavião-de-cauda-curta)	3	F
<i>Rupornis magnirostris</i> (gavião-carijó)	1, 2, 3, 4	F, C, Aa
<i>Buteogallus urubitinga</i> (gavião-preto)	OR	
<i>Buteogallus meridionalis</i> (gavião-caboclo)	1, 3	C, cp
<i>Spizaetus ornatus</i> (gavião-de-penacho)	2	F, E
<i>Harpyaliaetus coronatus</i> (águia-cinzenta)	OR	
FAMÍLIA FALCONIDAE		
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (acauã)	3, OR	C
<i>Micrastur ruficollis</i> (gavião-caburé)	2, 3	F
<i>Milvago chimachima</i> (carrapateiro)	1,2, 3, 4	C, cp, Aa
<i>Polyborus plancus</i> (caracará)	1,2, 3, 4	F, C, cp, Aa
<i>Falco femoralis</i> (falcão-de-coleira)	1, 3, 4, OR	C, cp
<i>Falco sparverius</i> (quiri-quiri)	1, 3	C, cp
ORDEM GALLIFORMES		
FAMÍLIA CRACIDAE		
<i>Penélope superciliaris</i> (jacupemba)	OR	F
<i>Penelope obscura</i> (jacu-guaçu)	1,2, 3, 4	F, C
<i>Pipile jacutinga</i> (jacutinga)	OR	
ORDEM GRUIFORMES		
FAMÍLIA RALLIDAE		
<i>Rallus sanguinolentus</i> (sanã)	2	RL
<i>Aramides saracura</i> (saracura-do-mato)	2, 3	F
<i>Porzana albicollis</i> (sana-carijó)	1	RL
FAMÍLIA CARIAMIDAE		
<i>Cariama cristata</i> (seriema)	1, 3, 4	C, cp
ORDEM CHARADRIIFORMES		
FAMÍLIA JACANIDAE		
<i>Jacana jacana</i> (jaçanã)	3, 4, OR	RL, E
FAMÍLIA CHARADRIIDAE		
<i>Vanellus chilensis</i> (quero-quero)	1, 3, 4	Aa, C, cp
<i>Hoploxypterus cayanus</i> (batuíra-de-esporão)	OR	
FAMÍLIA SCOLOPACIDAE		

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Gallinago paraguaiiae</i> (narceja)	1	cp
<i>Gallinago undulata</i> (narcejão)	OR	Cp
ORDEM COLUMBIFORMES		
FAMÍLIA COLUMBIDAE		
<i>Columba picazuro</i> (asa-branca)	1, 3, 4	F, C, Aa
<i>Columba cayennensis</i> (pomba-galega)	4	F, C
<i>Zenaida auriculata</i> (avoante)	1, 4	Aa
<i>Columbina talpacoti</i> (rolinha)	1, 3, 4	C, cp, Aa
<i>Columbina picui</i> (rolinha-branca)	3, OR	C, cp
<i>Scardafella squamata</i> (fogo-apagou)	1, 4	Aa, E
<i>Leptotila verreauxi</i> (juriti)	4, OR	C, Aa
<i>Leptotila rufaxilla</i> (gemedeira)	1,3	C, Aa
<i>Geotrygon montana</i> (pariri)	OR	
ORDEM PSITTACIFORMES		
FAMÍLIA PSITTACIDAE		
<i>Ara chloroptera</i> (arara-vermelha)	OR	
<i>Propyrrhura maracana</i> (maracanã-do-buriti)	OR	
<i>Pyrrhura frontalis</i> (tiriva)	1, 3, 4	F, C
<i>Pionopsitta pileata</i> (cuiu-cuiu)	1, 4	F, E
<i>Pionus maximiliani</i> (baitaca)	1, 4	F, C
<i>Amazona aestiva</i> (papagaio-verdadeiro)	1, 3, 4	F, C
<i>Amazona vinacea</i> (papagaio-de-peito-roxo)	3 ?, OR	E
ORDEM CUCULIFORMES		
FAMÍLIA CUCULIDAE		
<i>Coccyzus melacoryphus</i> (papa-lagarta)	1	C
<i>Piaya cayana</i> (alma-de-gato)	1, 3, 4	F, C, Aa
<i>Crotophaga ani</i> (anu-preto)	1, 3, 4	Aa
<i>Guira guira</i> (anu-branco)	1, 3, 4	Aa
<i>Tapera naevia</i> (saci)	1, 3, 4	C, cp, Aa
ORDEM STRIGIFORMES		
FAMÍLIA TYTONIDAE		
<i>Tyto alba</i> (suindara)	1	Aa
FAMÍLIA STRIGIDAE		
<i>Otus choliba</i> (corujinha-do-mato)	2, 3	F, C
<i>Otus atricapillus</i> (coruja-sapo)	OR	
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (murucututu)	2, 3	E
<i>Speotyto cunicularia</i> (buraqueira)	1, 3, 4, OR	C, Aa

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Strix hylophila</i> (coruja-listrada)	3, OR	
<i>Asio stygius</i> (mocho-diabo)	OR	
<i>Asio flammeus</i> (mocho-dos-banhados)	1,3	C
ORDEM CAPRIMULGIFORMES		
FAMÍLIA NYCTIBIIDAE		
<i>Nyctibius griseus</i> (urutau)	1, 3	C
FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE		
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (tuju)	OR	
<i>Chordeiles minor</i> (bacurau-norteamericano)	OR	
<i>Chordeiles acutipennis</i> (bacurau-de-asa-fina)	1	C, cp
<i>Podager nacunda</i> (corucão)	OR	
<i>Nyctidromus albicollis</i> (curiango)	3, OR	C
<i>Caprimulgus parvulus</i> (bacurau-pequeno)	OR	
<i>Hydropsalis brasiliana</i> (bacurau-tesoura)	1, 3, OR	C
<i>Macropsalis creagra</i> (bacurau-tesoura-gigante)	1, #	C
<i>Eleothreptus anomalus</i> (curiango-do-banhado)	OR	
ORDEM APODIFORMES		
FAMÍLIA APODIDAE		
<i>Streptoprocne sp.</i> (andorinhão)	3	
<i>Streptoprocne biscutata</i> (andorinhão-coleira-falha)	1, 3	
<i>Cypseloides senex</i> (andorinhão-de-cascata)	1	R
<i>Chaetura cinereiventris</i> (andorinhão-de-sobre-cinzento)	1, 4	
<i>Chaetura andrei</i> (andorinhão-do-temporal)	1, 4, OR	
FAMÍLIA TROCHILIDAE		
<i>Phaethornis eurynome</i> (rabo-branco-garganta-rajada)	2, 4	C
<i>Phaethornis pretrei</i> (rabo-branco-de-sobre-amarelo)	3	C
<i>Eupetomena macroura</i> (tesourão)	1, 3, 4	C
<i>Melanotrochilus fuscus</i> (beija-flor-preto-e-branco)	OR	
<i>Colibri serrirostris</i> (beija-flor-de-orelha-violeta)	1, 3, 4	C, cp
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (beija-flor-preto)	3	C
<i>Stephanoxis lalandi</i> (beija-flor-de-topete)	1	C, cp
<i>Chlorostilbon aureoventris</i> (besourinho-bico-vermelho)	1,3	C, Aa
<i>Leucochloris albicollis</i> (papo-branco)	1, 3	Aa
<i>Amazilia versicolor</i> (beija-flor-de-banda-branca)	1	Aa, C
ORDEM TROGONIFORMES		
FAMÍLIA TROGONIDAE		
<i>Trogon surrucura</i> (surucuá-de-peito-azul)	1, 4, OR	F, C

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
ORDEM CORACIIFORMES		
FAMÍLIA ALCEDINIDAE		
<i>Ceryle torquata</i> (Martim-pescador-grande)	3, OR	
<i>Chloroceryle amazona</i> (Martim-pescador-verde)	3, OR	
<i>Chloroceryle americana</i> (martim-pescador-pequeno)	3, OR	
ORDEM PICIFORMES		
FAMÍLIA BUCCONIDAE		
<i>Nystalus chacuru</i> (João-bobo)	1, 3, OR	C
<i>Malacoptila striata</i> (João-barbudo)	OR	
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE		
<i>Pteroglossus aracari</i> (araçari-de-bico-branco)	OR	
<i>Ramphastos dicolorus</i> (tucano-de-bico-verde)	1,3, OR	F, C
<i>Ramphastos toco</i> (tucanuçu)	1	C
FAMÍLIA PICIDAE		
<i>Picumnus cirratus</i> (pica-pau-anão-barrado)	1, 3, 4	F, C, Aa
<i>Picumnus nebulosus</i> (pica-pau-anão-carijó)	1	C, Aa
<i>Colaptes campestris</i> (pica-pau-do-campo)	1, 3, 4	C, Cp, aa
<i>Colaptes melanochloros</i> (pica-pau-verde-barrado)	1, 3, 4, OR	C, F
<i>Piculus aurulentus</i> (pica-pau-dourado)	1	C
<i>Celeus flavescens</i> (joão~-velho)	1, 3, 4	C
<i>Dryocopus lineatus</i> (pica-pau-de-banda-branca)	2, 4, OR	F, C
<i>Melanerpes flavifrons</i> (pica-pau-benedito)	4, OR	F, C
<i>Melanerpes candidus</i> (birro)	1, 3, 4, OR	Aa
<i>Veniliornis spilogaster</i> (picapauzinho-verde-carijó)	1, 3, 4	F,C
<i>Campephilus robustus</i> (pica-pau-rei)	3	
ORDEM PASSERIFORMES		
FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE		
<i>Melanopareia torquata</i> (tapaculo-de-colarinho)	4, OR	C
FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE		
<i>Makenziaena leachii</i> (borralhara-assobiadora)	2, 4, OR	Cp
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (choca-da-mata)	1,3,4	F, C, Aa
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> (choca-de-chapéu-vermelho)	1, 3, 4	C, Aa
<i>Dysithamnus mentalis</i> (choquinha-lisa)	1, 3, 4	C
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (chororozinho-asa-vermelha)	1	C
<i>Drymophila malura</i> (choquinha-carijó)	1, 3, 4	Aa, cp
<i>Pyriglena leucoptera</i> (papa-toaca-do-sul)	2, 3	
FAMÍLIA FORMICARIIDAE		

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Chamaeza campanisona</i> (tovaca-campainha)	1, 3, 4	F, C
FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE		
<i>Conopophaga lineata</i> (chupa-dente)	1, 3, 4	F, C
FAMÍLIA FURNARIIDAE		
<i>Furnarius rufus</i> (João-de-barro)	1,3,4	Aa
<i>Lepthastenura setaria</i> (grimpeirinho)	1, 3	F
<i>Synallaxis spixii</i> (joão-tenenem)	1, 3, 4	C, Aa
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (pichororé)	1, 3, 4	C, Aa
<i>Synallaxis frontalis</i> (petrim)	3, 4	C
<i>Synallaxis albescens</i> (uipí)	1, 3, 4	Cp
<i>Cranioleuca obsoleta</i> (arredio-meridional)	1, 3	F, C
<i>Anumbius annumbi</i> (cochicho)	1, 3, 4	C, cp
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (trepador-quiete)	3	
<i>Automolus leucophthalmus</i> (barranqueiro-olho-branco)	2	
<i>Heliobletus contaminatus</i> (trepadorzinho)	1, 3	C
<i>Sclerurus scansor</i> (vira-folhas)	2	
<i>Lochmias nematura</i> (João-porca)	1, 3	F, RL
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE		
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (arapaçu-verde)	1,3, 4	F, C
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (arapaçu-grande)	3, OR	
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (arapaçu-do-cerrado)	1, 3, 4	C, Aa
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (arapaçu-escamado)	1	F
FAMÍLIA TYRANNIDAE		
<i>Camptostoma obsoletum</i> (risadinha)	1,3, 4	C, cp, Aa
<i>Phaeomyias murina</i> (bagageiro)	1, 4	C
<i>Suiriri suiriri</i> (suiriri-cinzento)	1	C
<i>Myiopagis viridicata</i> (guaracava-de-olheiras)	2, 4	C
<i>Elaenia flavogaster</i> (guaracava-barriga-amarela)	1, 3	C
<i>Elaenia spectabilis</i> (guaracava-grande)	3	C
<i>Elaenia parvirostris</i> (guaracava-bico-pequeno)	3	C
<i>Elaenia mesoleuca</i> (tuque)	1, 3	C, Aa
<i>Elaenia chiriquensis</i> (chibum)	1,3	C, Aa
<i>Elaenia obscura</i> (tucão)	1, 4	C
<i>Serpophaga subcristata</i> (alegrinho)	1,3,4	C, cp, Aa
<i>Serpophaga nigricans</i> (João-pobre)	4, OR	RL
<i>Culicivora caudacuta</i> (papa-moscas-do-campo)	OR	
<i>Euscarthmus meloryphus</i> (enferrujado)	1,3	Cp

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (cabeçudo)	2, 3	
<i>Myiornis auricularis</i> (miudinho)	1	C
<i>Todirostrum plumbeiceps</i> (ferreirinho-cara-canela)	2, 3	
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (patinho)	2,3	
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Filipe)	1,3, 4	Aa
<i>Contopus cinereus</i> (papa-moscas-cinzento)	1, 3	
<i>Lathrotriccus euleri</i> (enferrujado)	1,3	C
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (guaracavuçu)	1, OR	C
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (principe)	1	cp
<i>Xolmis cinerea</i> (Maria-branca)	1,3, 4	cp
<i>Xolmis velata</i> (noivinha-branca)	1, 3	Cp
<i>Heteroxolmis dominicana</i> (noivinha-rabo-preto)	1	Cp
<i>Knipolegus lophotes</i> (Maria-preta-penacho)	1, 3 ,4	C, cp
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Maria-preta-bico-azulado)	1	C
<i>Colonia colonus</i> (viuvinha)	2, 4	C
<i>Gubernetes yetapa</i> (tesoura-do-brejo)	4	E
<i>Satrapa icterophrys</i> (suiriri-pequeno)	1, 4	Cp
<i>Hirundinea ferruginea</i> (gibão-de-couro)	1, 3, 4	C, cp
<i>Machetornis rixosa</i> (bentevi-do-gado)	1	Aa
<i>Muscipipra vetula</i> (tesoura-cinzenta)	1, 4	C, Aa
<i>Sirystes sibilator</i> (gritador)	2	
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Maria-cavaleira-rabo-enferrujado)	1,3, 4	C, cp
<i>Myiarchus swainsoni</i> (irrê)	1, 3, 4	C, Aa
<i>Pitangus sulphuratus</i> (bentevi9)	1, 3 , 4	F, C, Aa
<i>Megarynchus pitangua</i> (neinei)	2, 3	F, C
<i>Myiozetetes similis</i> (bentevizinho-penacho-vermelho)	1, 4	F, Aa
<i>Myiodynastes maculatus</i> (bentevi-rajado)	1, 3	F, Aa, C
<i>Legatus leucophaeus</i> (bentevi-pirata)	1	C
<i>Empidonomus varius</i> (peitica)	2	
<i>Tyrannus savana</i> (tesoura)	1, 3	Aa, cp
<i>Tyrannus melancholicus</i> (suiriri)	1,3	Aa
<i>Pachyramphus castaneus</i> (caneleiro)	1, 3	F
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (caneleiro-preto)	1, 3	F
<i>Pachyramphus validus</i> (caneleiro-chapéu-negro)	1, 3	F, a
<i>Tityra cayana</i> (anambé-branco-rabo-preto)	OR	
FAMÍLIA PIPRIDAE		
<i>Chiroxiphia caudata</i> (tangara)	2, 3	

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Schiffornis virescens</i> (flautim)	3	
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE		
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (andorinha-sobre-branco)	1, 3	C
<i>Phaeoprogne tapera</i> (andorinha-do-campo)	1, 3	C
<i>Progne chalybea</i> (andorinha-doméstica-grande)	1, 3	C
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (andorinha-pequena-de-casa)	1, 3, 4	C
<i>Alopochelidon fucata</i> (andorinha-morena)	1, OR	C
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (andorinha-serrador)	1, 3, 4	C
<i>Hirundo rústica</i> (andorinha-de-bando)	1	C
<i>Hirundo pyrrhonota</i> (andorinha-de-dorso-acanelado)	3, OR	C
FAMÍLIA CORVIDAE		
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (gralha-azul)	1, OR	E
<i>Cyanocorax cristatellus</i> (gralha-do-cerrado)	3, 4, OR	C
<i>Cyanocorax chrysops</i> (gralha-picaça)	3	
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE		
<i>Cistothorus platensis</i> (corruíra-do-campo)	1	C, cp
<i>Troglodytes aedon</i> (corruíra)	1, 3, 4	Aa
FAMÍLIA MUSCICAPIDAE		
<i>Platycichla flavipes</i> (sabiá-preta)	OR	
<i>Turdus subalaris</i> (sabiá-ferreiro)	1, 3	F
<i>Turdus rufiventris</i> (sabiá-laranjeira)	1, 3, 4	C
<i>Turdus leucomelas</i> (sabiá-barranco)	1, 3	C, F, E
<i>Turdus amaurochalinus</i> (sabiá-poca)	1, 3, 4	C, E
FAMÍLIA MIMIDAE		
<i>Mimus saturninus</i> (sabiá-do-campo)	1, 3, 4	Aa, C, cp
FAMÍLIA MOTACILLIDAE		
<i>Anthus lutescens</i> (caminheiro-zumbidor)	3	cp
<i>Anthus correndera</i> (caminheiro-de-espora)	1, 3	cp
<i>Anthus</i> sp.	1	
FAMÍLIA VIREONIDAE		
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (pitiguari)	1, 3, 4	F, C, Aa
<i>Vireo chivi</i> (juruviara)	1, 3	F, C, Aa
<i>Hylophilus poicilotis</i> (verdinho-coroado)	3, OR	
<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (vite-vite-olho-cinza)	2, 3	
FAMÍLIA EMBERIZIDAE		
<i>Parula pitiayumi</i> (mariquita)	1, 3, 4	F, C, Aa

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (pia-cobra)	1, 3, 4	cp, E
<i>Basileuterus culicivorus</i> (pula-pula)	1, 3, 4	C, Aa
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (pula-pula-assobiador)	1, 3, 4	F, C
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (pula-pula-ribeirinho)	3, OR	RL
<i>Coereba flaveola</i> (cambacica)	2	E
<i>Dendroica striata</i> (mariquita-perna-clara)	2	E
<i>Conirostrum speciosum</i> (figuinha-rabo-castanho)	2	E
<i>Schystochlamys ruficapillus</i> (bico-de-veludo)	1, 3, 4	C, cp
<i>Neothraupis fasciata</i> (cigarra-do-campo)	1, 3	C
<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (bandoleta)	1, 3	C
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (cabecinha-castanha)	1	Aa
<i>Hemithraupis guira</i> (saira-de-papo-preto)	3, OR	F
<i>Tachyphonus coronatus</i> (tié-preto)	2, 3	E
<i>Trichothraupis melanops</i> (tié-de-topete)	1, 3	F
<i>Piranga flava</i> (sanhaço-de-fogo)	OR	
<i>Thraupis sayaca</i> (sanhaço-cinzento)	1, 3, 4	Aa
<i>Thraupis palmarum</i> (sanhaço-do-coqueiro)	3	
<i>Thraupis bonariensis</i> (sanhaço-papa-laranja)	OR	
<i>Stephanophorus diadematus</i> (sanhaço-frade)	1	F
<i>Pipraeidea melanonota</i> (saira-viuva)	1, 3	F, C
<i>Euphonia chloroctica</i> (vivi)	2, 3	E
<i>Euphonia violacea</i> (gaturamo)	1	F
<i>Tangara desmaresti</i> (saira-lagarta)	OR	
<i>Tangara cayana</i> (saira-amarelo)	3	
<i>Tangara peruviana</i> (saira-lagarta)	1	F, C
<i>Dacnis cayana</i> (saí-azul)	2, 3, 4	Aa
<i>Tersina viridis</i> (saí-andorinha)	1, 3	Aa
<i>Zonotrichia capensis</i> (tico-tico)	1, 3, 4	Aa, cp
<i>Ammodramus humeralis</i> (tico-tico-do-campo)	1, 3, 4	cp, Aa
<i>Haplospiza unicolor</i> (cigarra-bambu)	OR	
<i>Poospiza lateralis</i> (quete)	1, 3	F, C, Aa
<i>Sicalis citrina</i> (canarinho-rasteiro)	3, 4	cp
<i>Sicalis flaveola</i> (canário-da-terra-verdadeiro)	1, 2, 3	Aa, cp
<i>Sicalis luteola</i> (tipio)	1	cp
<i>Emberizoides herbicola</i> (canário-do-campo)	1, 3, 4	C, cp
<i>Emberizoides ypiranganus</i> (canário-do-brejo)	1	B
<i>Embernagra platensis</i> (sabiá-do-banhado)	1, 3	B

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Volatinia jacarina</i> (tsiu)	1, 3, 4	Aa
<i>Sporophila plumbea</i> (patativa-verdadeira)	1, 2	cp
<i>Sporophila lineola</i> (bigodinho)	OR	
<i>Sporophila caerulescens</i> (coleirinho)	1, 3, 4	Aa, cp
<i>Sporophila bouvreuil</i> (caboclinho)	2	cp
<i>Sporophila hypoxantha</i> (caboclinho-de-barriga-vermelha)	OR	cp
<i>Sporophila cinamomea</i> (caboclinho-chapéu-cinzento)	OR	
<i>Sporophila melanogaster</i> (caboclinho-barriga-preta)	OR	
<i>Oryzoborus angolensis</i> (curió)	OR	
<i>Amaurospiza moesta</i> (negrinho-do-mato)	3	
<i>Charitospiza eucosma</i> (mineirinho)	OR	
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (tico-tico-rei)	1, 3, 4	C, Aa, cp
<i>Saltator similis</i> (trinca-ferro)	1, 3, 4	F, Aa
<i>Saltator atricollis</i> (bico-de-pimenta)	OR	
<i>Passerina glaucocerulea</i> (azulinho)	2	
<i>Passerina brissoni</i> (azulão)	2	E
FAMÍLIA ICTERIDAE		
<i>Cacicus haemorrhous</i> (guaxe)	3, 4	F, E
<i>Cacicus chrysopterus</i> (tecelão)	2	E
<i>Icterus cayanensis</i> (inhapim)	2	E
<i>Leistes superciliaris</i> (polícia-inglesa-do-sul)	1, 3, 4	E
<i>Pseudoleites guirahuro</i> (chopim-do-brejo)	1, 3, 4	B
<i>Gnorimopsar chopi</i> (melro)	1	C, cp
<i>Molothrus bonariensis</i> (chopim)	1	Aa
<i>Molothrus rufoaxillaris</i> (chopim-azeviche)	OR	
FAMÍLIA FRINGILIDAE		
<i>Carduelis magellanicus</i> (pintassilgo)	1, 3, 4	Aa, C, cp

Legenda: 1 - Scherer-Neto *et al.*, 1996; 2 - Carrano & Ribas, 2000; 3 - Straube *et al.*, 2000; 4 - Avaliação Ecológica Rápida (Scherer-Neto & Ribas, 2002); outros registros (OR).

Ambiente: parque (P); floresta (F); cerrado (C); campo (cp); áreas alteradas (Aa); entorno (E); beira de rio ou lago (RL), brejo (B).