

Anexo 3.10 - Lista de Espécies de Avifauna Registrada para o Parque Estadual da Ilha do Mel e Entorno

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
Anatidae (Leach, 1820)							
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho		N	A s	G, H	L	B
Spheniscidae (Bonaparte, 1831)							
<i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster, 1781)	pinguim-de-magalhães	X (carcassa)	NT	A n	P	P	O
Diomedidae (Gray, 1840)							
<i>Diomedea epomophora</i> (Lesson, 1825)	albatroz-real		N	A s	ZP	M	O
Fregatidae (Degland & Gerbe, 1867)							
<i>Fregata magnificens</i> (Mathews, 1914)	tesourão	X	N	A s	P	A	B
Sulidae (Reichenbach, 1849)							
<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	atobá-pardo	X	N	A n	P	M	B
Phalacrocoracidae (Reichenbach, 1849)							
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	X	N	A n	P	M	B
Ardeidae (Leach, 1820)							
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	X	N	A s	P, R, A	B	O
<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	savacu-de-coroa		E N	A s	P, R, A	B	O
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		N	A s	P, R, A	B	B
<i>Sirigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	X	N	A s	P, R, A	B	B
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		N	S	I	B	B
<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	garça-moura	X	N	A s	P, R, A	B	B
<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	garça-branca-grande	X	N	A s	P, R, A	P,B	B
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	X	N	A s	P, R, A	P,B	B
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul	X	N	A s	P, R, A	P, MA	B
Cathartidae (Lafresnaye, 1839)							
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	X	N	S	D	P,A	B
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	X	N	S	D	P,A	B
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758) ???	urubu-rei		N	S	D		
Accipitridae (Vigors, 1824)							
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro		VU	F	O	F	O

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira		N	A, S	I	A	O
<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	caranguejeiro		N	S	C	MA	O
<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-cauda-curta	X	N	F	O	F, A	O
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	X	N	F, S	O	F, R	B
<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno		E N	F, S	O	F,R	O
Falconidae (Leach, 1820)							
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	X	N	G	O	P,F,R	B
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	X	N	G	O	P,F,R	B
<i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816)	chimango		N	G	O		B
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã		N	G	O	F,R	O
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé		N	F	O	F,R	O
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira		N	G	O	F,R	O
Rallidae (Rafinesque, 1815)							
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	X	N	A s	I, G	MA, R	B
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	X	N	A s	I, G	F,R,B	B
<i>Pardirallus sp.</i> (Boddaert, 1783)	saracura		N	A s	I, G	B	O, A
<i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1837)	saracura-do-banhado		N	A s	I, G	B	O, A
Charadriidae (Leach, 1820)							
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	batuiruçu		N	LA	IA	P	O
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	X	N	LA	IA	P	B
<i>Charadrius semipalmatus</i> (Bonaparte, 1825)	batuíra-de-bando		N	LA	IA	P	B
<i>Charadrius collaris</i> (Vieillot, 1818)	batuíra-de-coleira	X	N	LA	IA	P	B
<i>Charadrius modestus</i> (Lichtenstein, 1823)	batuíra-de-peito-tijolo		N	LA	IA	P	O
Haematopodidae (Bonaparte, 1838)							
<i>Haematopus palliatus</i> (Temminck, 1820)	piru-piru		N	CR	C	P	B
Scolopacidae (Rafinesque, 1815)							
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado		N	LA	I,A	P	O
<i>Tringa sp.</i>	maçarico		N	LA	I,A	B, P	O
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	X	N	LA	I,A	B, P	B

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	vira-pedras		N	LA	I,A	B, P	O
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-papo-vermelho		N	LA	I,A	P	O
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	maçarico-branco		N	LA	I,A	P	O
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco		N	LA	I,A	P	B
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete		N	LA	I,A	P	O
Laridae (Rafinesque, 1815)							
<i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823)	gaivota-maria-velha		N	M	P,Z	M	O
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818)	gaivota-de-cabeça-cinza		N	M	P,Z	M	O
<i>Larus dominicanus</i> (Lichtenstein, 1823)	gaivotão	X	N	M	P,Z	M, P	B
Sternidae (Vigors, 1825)							
<i>Sterna</i> sp.	trinta-réis			M	P		B
<i>Sterna euryginatha</i> (Vieillot, 1818)	trinta-réis de bico amarelo		N	M	P	M, P	B
<i>Sterna hirundinacea</i> (Lesson, 1831)	trinta-réis-de-bico-vermelho	X	N	M	P	M, P	B
<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	trinta-réis-real		N	M	P	M, P	B
Rynchopidae							
<i>Rynchops niger</i> (Linnaeus, 1758)	talha-mar	X	N	M	P	M, P	B
Columbidae (Leach, 1820)							
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega		N	S	G, I	F, R	O
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		N	F, S	G, I	F, R	O
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	X	N	S	G, I	F, R	B
<i>Columbina talpocoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	X	N	S	G, I	R	B
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu	X	N	S	G,I	R, F	B
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		N	S	G, I	R, F	B
<i>Geotrygon montana</i> (Linnæus, 1758)	pariri		N	S	G, I	F, R	O
Psittacidae Rafinesque, 1815							
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	X	N	SF	F	F, R	B
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	X	N	SF	F	F	O
<i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-de-cara-roxa	X	E N	SF	F	F, R	B

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
Cuculidae (Leach, 1820)							
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	X	N	MF	I	F,R	B
<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto		N	A, S	I	R	B
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		N	A, S	I	R	B
Tytonidae (Mathews, 1912)							
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja		N	G	C	F	O
Strigidae (Leach, 1820)							
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo		N	F	C	F	O
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	X	N	A, S	C	P, R	B
Nyctibiidae (Chenu & Des Murs, 1851)							
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua		N	A	I	F, R	A
Caprimulgidae (Vigors, 1825)							
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Temminck, 1822)	tuju		N	A	I	R	O
<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau		N	A	I	R	O
<i>Hydropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesoura-gigante		N	A	I	R	O
Apodidae (Olphe-Galliard, 1887)							
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	X	N	A	I	A	B
<i>Chaetura meridionalis</i> (Hellmayr, 1907)	andorinhão-do-temporal		N	A	I	A	B
Trochilidae (Vigors, 1825)							
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	X	N	MF	N, I	R, F	B
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	X	N	MF	N, I	R, F	B
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	X	N	MF	N, I	R, F	B
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca		N	MF	N, I	R, F	B
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto		N	MF	N, I	R, F	B
Trogonidae (Lesson, 1828)							
<i>Trogon viridis</i> (Linnaeus, 1766)	surucuá-grande-de-barriga-amarela		N	MF	G, I	R, F	B
<i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817)	surucuá-variado	X	N	MF	G,I	R, F	B
Alcedinidae (Rafinesque, 1815)							

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande]	X	N	A n	P	MA,B, L	B
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	X	N	A n	P	MA,B, L	B
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		N	A n	P	MA,B, L	B
Picidae (Leach, 1820)							
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	X	N	MF	I	F,R	B
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		N	G	I	R	B
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		N	MF	I	F,R	O
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1819)	pica-pau-rei		N	MF	I	F,R	O
Thamnophilidae (Swainson, 1824)							
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (Vieillot, 1816)	choca-da-mata		N	MF	I, G	F, R	B
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão		N	MF	I, G	F, R	O
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul		N	MF	I, G	F, R	B
Conopophagidae (Sclater & Salvin, 1873)							
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	X	N	MF	I	F,R	B
Furnariidae Gray, 1840							
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	X	N	S	I	R	B
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	X	N	MF	I	F,R	B
<i>Synallaxis spixi</i> (Sclater, 1856)	joão-teneném	X	N	IF	I	R	B
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barraqueiro-de-olho-branco		N	IF	I	F,R	B
Pipridae (Rafinesque, 1815)							
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	X	N	MF	I,G	F,R	B
Tityridae (Gray, 1840)							
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	X	N	MF	I, G	F,R	B
<i>Pachyrampus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		N	SF	I, G	F,R	B
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda		N	SF	I, G	F,R	B
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto		N	SF	I, G	F,R	B
Cotingidae (Bonaparte, 1849)							

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga		N	SF	I, G, F	F,R	A, B
Rhynchocyclidae (Berlepsch, 1907)							
<i>Incertae sedis</i>							
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818)	patinho	X	N	MF	I	R,F	B
<i>Phylloscartes sp.</i>			-	SF	I	F, R	
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato	X	N	SF	I	F, R	B
Tyrannidae (Vigors, 1825)							
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	X	N	MF	I	F,R	B
<i>Elaenia obscura</i> (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837)	tucão		N	MF	I	R	B
<i>Mionectes rufiventris</i> (Cabanis, 1846)	abre-asa-de-cabeça-cinza	X	N	MF	I	F,R	B
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846)	cabeçudo	X	N	MF	I	F,R	B
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó		N	MF	I	F,R	B
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		N	MF	I	F,R	B
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu		N	MF	I	F,R	B
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		N	A	I	R	O
<i>Elaenia sp.</i>			N	MR	I, G	F,R	B
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		N	MR	I	R	B
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	X	N	SF	I, G	F,R	B
<i>Attila phoenicurus</i> (Pelzeln, 1868)	capitão-castanho		N	SF	I, G	F,R	B
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador		N	SF	I, G	F,R	O
<i>Myiarchus sp.</i>			N	MF	I, G	R	B
<i>Myiarchus swainsoni</i> (Cabanis & Heine, 1859)	irré		N	MF	I, G	F,R	B
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	X	N	G	I, G	F,R	B
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei		N	G	I, G	F,R	B
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado		N	SF	I, G	F,R	B
<i>Legatus leucophaeus</i> (Graham, 1992)	bem-te-vi-pirata		N	SF	I, G	F,R	B

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		N	SF	I, G	F,R	B
<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri		N	G	I	F,R	B
<i>Tyrannus savana</i> (Vieillot, 1808)	tesourinha		N	G	I	F,R	B
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	X	N	G	I	R	B
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		N	MR	I	R	B
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	X	N	MR	I	R	B
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado		N	MR	I	R	O
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		N	G	I	R	B
Vireonidae (Swainson, 1837)							
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		N	G	I, G	F,R	B
<i>Vireo olivaceus chivi</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		N	MF	I, G	F,R	B
<i>Hylophilus poicilotis</i> (Temminck, 1822)	verdinho-coroadado		N	MF	I, G	F,R	B
Hirundinidae (Rafinesque, 1815)							
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	X	N	A	I	A	B
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	X	N	A	I	A	B
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	X	N	A	I	A	B
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo		N	A	I	A	B
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande		N	A	I	A	B
<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-de-bando		N	A	I	A	O
Troglodytidae (Swainson, 1831)							
<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	corruíra	X	N	G	I	R	B
Turdidae (Rafinesque, 1815)							
<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-uma	X	N	MF	F, I	F,R	B
<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	X	N	MF	F, I	F,R	B
<i>Turdus amaurochalinus</i> (Cabanis, 1850)	sabiá-poca	X	N	MF	F, I	F,R	B
<i>Turdus albicollis</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-coleira		N	MF	F, I	F,R	B
<i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-do-campo		N	G	I	P, R	B
Coerebidae (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)							
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	X	N	MF	N, I	F,R	B
Thraupidae (Cabanis, 1847)							
<i>Saltator similis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye,	trinca-ferro-verdadeiro	X	N	M R	G	F,R	B

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
1837)							
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	X	N	MR	G, F	R	B
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	X	N	MR	G, F	R	B
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno	X	N	SF	G, F	F,R	B
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	X	N	SF	G, F	F,R	B
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	X	N	SF	F	F,R	B
<i>Tangara cyanocephala</i> , (Statius Muller, 1776)	saíra-militar	X	N	SF	F	F,R	B
<i>Tangara cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-encontro-azul		N	SF	F	F,R	B
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	X	N	SF	F	F,R	B
<i>Pipraeidea melanota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		N	SF	F, I	F,R	B
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha		N	SF	I, F	F,R	B
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	X	N	SF	N, F	F,R	B
<i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809)	figuinha-do-mangue	X	VU	SF	N, F	MA	B
Emberizidae (Vigors, 1825)							
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	X	N	G	G, I	R	B
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	X	N	G	G	R	B
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		N	G	G	R	B
<i>Sporophila caerulea</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	X	N	MR	G	R	B
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto		N	IF	G, I	F	O
Parulidae (Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947)							
<i>Parula pitayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	X	N	SF	I	F,R	B
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	X	N	G	I	B	B
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	X	N	MF	I	R	B
<i>Basileuterus leucophrys</i> (Pelzeln, 1868)	pula-pula-de-sobrancelha		N	MF	I	R	-
Icteridae Vigors, 1825							
<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)	asa-de-telha		N	G	I, G	R, B	-
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	X	N	G	I, G	R, B	B
Fringillidae Leach, 1820							

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.

FAMÍLIA	NOME POPULAR	REGISTROS DE CAMPO	CATEGORIA DE AMEAÇA	ESTRATO DE FORRAGEAMENTO	DIETA	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	POTENCIAL PARA OBSERVAÇÃO
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	X	N	SF	F	F,R	B
Passeridae Rafinesque, 1815							
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	X	N	G	G	A N	B

Fonte: Pedro Scherer Neto, 2011.

Legenda: Potencial para observação B bom, O ocasional, A auditivo; Ambiente de Ocorrência L lago, P praia, M marinho, A aéreo, B brejo – banhado, MA mangue, F floresta, R restinga; Dieta F frugívoro, G granívoro, H herbívoro, N nectarívoro, ZP zoopanctônico, P pisívoro, D decompositor, R répteis, M marinhos, I insetívoro, O onívoro, C carcinófago; Estratos de forrageamento IF inferior florestal, MF médio florestal, SF superior florestal, F floresta em geral, FS solo da floresta, MR médio restinga, S solo, A aéreo, A, S aéreo/ solo, G generalista, LA lodo arenoso, CR costão rochoso, M marinho, A n aquático, nectônico, A s aquático superficial; Categorias de ameaças no Paraná e Brasil N não ameaçado, E N em perigo, VU vulnerável.