

Anexo 3.11 - Anfíbios e Répteis Registrados para o Parque Estadual da Ilha do Mel e Entorno, Paranaguá, Estado do Paraná

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES	PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
ANFÍBIOS				
ANURA				
Brachycephalidae				
<i>Ischnocnema guentheri</i>	Rãzinha-das-florestas	FTB	FAT-SL	ENT "
Hylidae				
<i>Dendropsophus minutus</i>	Perereca	FSM, FTB, RES, AA	APL	AUD
<i>Scinax alter</i>	Perereca	FTB, RES, AA	FAT-SS	AUD
<i>Scinax fuscovarius</i>	Perereca-das-casas	AA	APL	OBS
<i>Scinax rizibilis</i>	Perereca	FSM, FTB, AA	APL	ENT "
Leiuperidae				
<i>Physalaemus cuvieri</i>	Rã-cachorro	FTB, AA	APL	ENT "
Leptodactylidae				
<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã	FSM, FTB, RES, AA	APL	OBS
<i>Leptodactylus bokermanni</i>	Rãzinha	FSM	FAT-SS	AUD
Microhylidae				
<i>Elachistocleis bicolor</i>	Sapinho	FTB, AA	APL	ENT "
RÉPTEIS				
TESTUDINES				
Chelidae				
<i>Hydromedusa tectifera</i>	Cágado	FSM, FTB, MN	APL	ENT
Cheloniidae				
<i>Chelonia mydas</i>	Tartaruga-marinha	MAR	APL	VST, MUS, LIT
<i>Caretta caretta</i>	Cabeçuda	MAR	APL	MUS, LIT
<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tartaruga-de-pente	MAR	APL	VST
<i>Lepidochelys olivacea</i>	Tartaruga-verde	MAR	APL	LIT
Dermochelyidae				
<i>Dermochelys coriacea</i>	Tartaruga-de-couro	MAR	APL	ENT, LIT
CROCODYLIA				
Alligatoridae				
<i>Caiman latirostris</i>	Jacaré-de-papo-amarelo	FTB, MN, MAR	APL	OBS, MUS, LIT

Legenda: Ambientes: FSM: Floresta Ombrófila Densa Submontana; FTB: Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas; RES: Restingas; MN: Manguezais; MAR: Ambiente marinho; AA: Áreas alteradas; Distribuição: FAT-SL: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica *sensu lato*; FAT-SS: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica *sensu stricto*; FAT-TB: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica de Terras Baixas; APL: Espécie de Distribuição Ampla; EX: Espécie Exótica; Origem da Informação: OBS: Observação em campo; AUD: Registro auditivo; MUS: Registro museológico; LIT: Registro em literatura; ENT: Registro por entrevistas (* registros de Peterson Leivas).

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES	PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
SQUAMATA				
LAGARTOS				
Polychrotidae				
<i>Enyalius iheringii</i>	Camaleão	FSM, FTB	FAT-SS	ENT
Gekkonidae				
<i>Hemidactylus mabouia</i>	Lagartixa-de-parede	RES, AA	EX	OBS, MUS
Anguidae				
<i>Ophiodes fragilis</i>	Cobra-de-vidro	FSM, FTB, RES, AA	FAT-SL	ENT
Teiidae				
<i>Tupinambis merianae</i>	Lagarto, teiú	FSM, FTB, RES, MN, AA	APL	OBS, MUS, ENT
Gymnophthalmidae				
<i>Colobodactylus taunayi</i>	Lagartixa	FSM	FAT-SS	MUS
<i>Placosoma glabellum</i>	Lagartixa	FSM	FAT-SS	MUS
AMPHISBENAS				
Amphisbaenidae				
<i>Amphisbaena microcephala</i>	Cobra-cega	FSM, FTB, RES, AA	FAT-SL	MUS
SERPENTES				
Colubridae				
<i>Chironius exoletus</i>	Cobra-cipó, voadeira	FSM, FTB, RES, AA	APL	OBS
<i>Chironius fuscus</i>	Cobra-cipó, voadeira	FSM, FTB	APL	MUS
<i>Chironius laeivcollis</i>	Cobra -ipó, voadeira	FTB	FAT-SS	MUS
<i>Spilotes pullatus</i>	Caninana	FSM, FTB, RES	APL	ENT, OBS
Dipsadidae				
<i>Clelia plumbea</i>	Muçurana, cobra-preta	FSM, FTB	APL	MUS, LIT
<i>Caaeteboia amarali</i>	---	FTB	FAT-SS	MUS, LIT
<i>Dipsas albifrons</i>	Dormideira	FSM, FTB	FAT-SS	MUS, LIT
<i>Helicops carinicaudus</i>	Cobra-d'água	FTB, RES, AA	FAT-SS	ENT
<i>Liophis miliaris</i>	Cobra-d'água	FSM, FTB, RES, MN, AA	APL	OBS, MUS, LIT, ENT
<i>Oxyrhopus clathratus</i>	Coral-falsa	FSM, FTB	FAT-SL	MUS, LIT
<i>Sibynomorphus neuwiedi</i>	Dormideira	FSM, FTB, AA	FAT-SL	MUS, LIT
Elapidae				
<i>Micrurus corallinus</i>	Coral-verdadeira	FSM, FTB, RES	FAT-SL	OBS, MUS, LIT, ENT

Legenda: Ambientes: FSM: Floresta Ombrófila Densa Submontana; FTB: Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas; RES: Restingas; MN: Manguezais; MAR: Ambiente marinho; AA: Áreas alteradas; Distribuição: FAT-SL: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica *sensu lato*; FAT-SS: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica *sensu stricto*; FAT-TB: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica de Terras Baixas; APL: Espécie de Distribuição Ampla; EX: Espécie Exótica; Origem da Informação: OBS: Observação em campo; AUD: Registro auditivo; MUS: Registro museológico; LIT: Registro em literatura; ENT: Registro por entrevistas (* registros de Peterson Leivas).

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES	PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
Viperidae				
<i>Bothropoides jararaca</i>	Jararaca	FSM, FTB, RES, AA	APL	OBS, MUS, LIT, ENT
<i>Bothrops jararacussu</i>	Jararacuçu	FSM, FTB, AA	FAT-SL	OBS, MUS, LIT, ENT

Fonte: Sergio Morato, 2011.

Legenda: Ambientes: FSM: Floresta Ombrófila Densa Submontana; FTB: Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas; RES: Restingas; MN: Manguezais; MAR: Ambiente marinho; AA: Áreas alteradas; Distribuição: FAT-SL: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica *sensu lato*; FAT-SS: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica *sensu stricto*; FAT-TB: Espécie Endêmica da Floresta Atlântica de Terras Baixas; APL: Espécie de Distribuição Ampla; EX: Espécie Exótica; Origem da Informação: OBS: Observação em campo; AUD: Registro auditivo; MUS: Registro museológico; LIT: Registro em literatura; ENT: Registro por entrevistas (* registros de Peterson Leivas).