

ANEXO 4 - LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES DO PARQUE ESTADUAL DO MONGE, MUNICÍPIO
DA LAPA, PARANÁ

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	AMBIENTE
ORDEM TINAMIFORMES	
FAMÍLIA TINAMIDAE	
<i>Crypturellus tataupa</i> (nhambu-chitã)	F, Cp
<i>Rhynchotus rufescens</i> (perdiz)	F, Cp, E
<i>Nothura maculosa</i> (codorna-comum)	C, E
ORDEM CICONIIFORMES	
FAMÍLIA ARDEIDAE	
<i>Bubulcus ibis</i> (garça-vaqueira)	C, Aa, E
<i>Syrigma sibilatrix</i> (maria-faceira)	C, B, E
FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE	
<i>Theristicus caudatus</i> (curicaca)	Aa, C, E
FAMÍLIA CATHARTIDAE	
<i>Coragyps atratus</i> (urubu-de-cabeça-preta)	A, Aa, E
<i>Cathartes aura</i> (urubu-de-cabeça-vermelha)	A, E
ORDEM FALCONIFORMES	
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE	
<i>Buteo brachyurus</i> (gavião-de-cauda-curta)	F, Cp, E
<i>Rupornis magnirostris</i> (gavião-carijó)	F, Cp, Aa, E
<i>Spizaetus tyrannus</i> (gavião-pega-macaco)	F, E
<i>Geranospiza caerulescens</i> (gavião-pernilongo)	F, C, E
FAMÍLIA FALCONIDAE	
<i>Micrastur semitorquatus</i> (gavião-relógio)	F, E
<i>Milvago chimachima</i> (carrapateiro)	F, C, Cp, Aa, E
<i>Polyborus plancus</i> (caracará)	C, Cp, Aa, E
<i>Falco sparverius</i> (quiriquiri)	C, Cp, Aa, E
ORDEM GALLIFORMES	
FAMÍLIA CRACIDAE	
<i>Penelope obscura</i> (jacuaçu)	F, E
FAMÍLIA PHASIANIDAE	
<i>Odontophorus capueira</i> (uru)	F, E
ORDEM GRUIFORMES	
FAMÍLIA RALLIDAE	
<i>Aramides saracura</i> (saracura-do-mato)	F, E
ORDEM CHARADRIIFORMES	
FAMÍLIA CHARADRIIDAE	
<i>Vanellus chilensis</i> (quero-quero)	C, Aa, E
ORDEM COLUMBIFORMES	
FAMÍLIA COLUMBIDAE	
<i>Columba picazuro</i> (asa-branca)	C, Cp, F, Aa, E

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	AMBIENTE
<i>Zenaida auriculata</i> (avoante)	C, Cp, Aa, E
<i>Columbina talpacoti</i> (rolinha)	C, Cp, Aa, E
<i>Leptotila</i> sp. (juriti)	C, Cp, F, Aa, E
ORDEM PSITTACIFORMES	
FAMÍLIA PSITTACIDAE	
<i>Pyrrhura frontalis</i> (tiriba-de-testa-vermelha)	F, Aa, E
<i>Pionus maximiliani</i> (maitaca)	F, Aa, E
ORDEM CUCULIFORMES	
FAMÍLIA CUCULIDAE	
<i>Piaya cayana</i> (alma-de-gato)	Cp, F, Aa, E
<i>Crotophaga ani</i> (anu-preto)	Cp, Aa, E
<i>Guira guira</i> (anu-branco)	Cp, C, Aa, E
<i>Tapera naevia</i> (saci)	Cp, Aa, E
ORDEM STRIGIFORMES	
FAMÍLIA STRIGIDAE	
<i>Speotyto cunicularia</i> (buraqueira)	C, E
<i>Strix hylophila</i> (coruja-listrada)	F, E
ORDEM CAPRIMULGIFORMES	
FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE	
<i>Nyctidromus albicollis</i> (curiango)	F, E
ORDEM APODIFORMES	
FAMÍLIA APODIDAE	
<i>Chaetura andrei</i> (andorinhão-do-temporal)	A
ORDEM TROCHILIFORMES	
FAMÍLIA TROCHILIDAE	
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (beija-flor-preto)	Cp, E
<i>Stephanoxis lalandi</i> (beija-flor-de-topete)	Cp, E
<i>Chlorostilbon aureoventris</i> (besourinho-de-bico-vermelho)	F, Cp, Aa, E
<i>Leucochloris albicollis</i> (papo-branco)	F, Cp, Aa, E
ORDEM TROGONIFORMES	
FAMÍLIA TROGONIDAE	
<i>Trogon surrucura</i> (surucuá-de-peito-azul)	F, E
ORDEM CORACIIFORMES	
FAMÍLIA ALCEDINIDAE	
<i>Chloroceryle americana</i> (martim-pescador-pequeno)	R, E
ORDEM PICIFORMES	
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE	
<i>Ramphastos dicolorus</i> (tucano-de-bico-verde)	F, Aa, E
FAMÍLIA PICIDAE	
<i>Picumnus cirratus</i> (pica-pau-anão-barrado)	F, Cp, Aa, E
<i>Colaptes campestris</i> (pica-pau-do-campo)	C, Cp, Aa, E
<i>Colaptes melanochloros</i> (pica-pau-verde-barrado)	F, Cp, Aa, E

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	AMBIENTE
<i>Melanerpes candidus</i> (birro)	C, Aa, E
<i>Veniliornis spilogaster</i> (pica-pauzinho-verde-carijó)	F, Cp, Aa, E
ORDEM PASSERIFORMES	
FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE	
<i>Batara cinerea</i> (matracão)	F, Cp, E
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (choca-da-mata)	F, Cp, E
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> (choca-de-chapéu-vermelho)	Cp, E
<i>Dysithamnus mentalis</i> (choquinha-lisa)	F, Cp, E
<i>Drymophila malura</i> (choquinha-carijó)	Cp, E
FAMÍLIA FORMICARIIDAE	
<i>Chamaeza campanisona</i> (tovaca-campainha)	F, E
FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE	
<i>Conopohaga lineata</i> (chupa-dente)	F, E
FAMÍLIA FURNARIIDAE	
<i>Furnarius rufus</i> (joão-de-barro)	Cp, C, Aa, E
<i>Leptasthenura setaria</i> (grimpeiro)	F, E
<i>Synallaxis spixi</i> (joão-teneném)	Cp, E
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (pichororé)	Cp, E
<i>Synallaxis cinerascens</i> (João-teneném-da-mata)	F, E
<i>Heliobletus contaminatus</i> (trepadorzinho)	F, Cp, E
<i>Sclerurus scansor</i> (vira-folhas)	F, E
<i>Lochmias nematura</i> (joão-porca)	F, E
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE	
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (arapaçu-verde)	F, Cp, E
<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (arapaçu-escamado)	F, E
FAMÍLIA TYRANNIDAE	
<i>Camptostoma obsoletum</i> (risadinha)	F, Cp, Aa, E
<i>Serpophaga subcristata</i> (alegrinho)	F, Cp, Aa, E
<i>Euscarthmus meloryphus</i> (barulhento)	F, E
<i>Phylloscartes ventralis</i> (borboletinha-do-mato)	F, Cp, E
<i>Todirostrum plumbeiceps</i> (ferreirinho-de-cara-canela)	Cp, E
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (bico-chato-de-cabeça-cinza)	F, E
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (patinho)	F, E
<i>Machethornis rixosus</i> (bentevi-do-gado)	C, Cp, Aa, E
<i>Pitangus sulphuratus</i> (bentevi)	F, C, Cp, Aa, E
FAMÍLIA PIPRIDAE	
<i>Chiroxiphia caudata</i> (tangará)	F, E
<i>Schiffornis virescens</i> (flautim)	F, E
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE	
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (andorinha-pequena-de-casa)	C, Cp, Aa, E
FAMÍLIA CORVIDAE	
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (gralha-azul)	F, E

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	AMBIENTE
<i>Cyanocorax chrysops</i> (gralha-picaça)	F, Cp, E
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE	
<i>Troglodytes aedon</i> (corruíra)	Cp, Aa, E
FAMÍLIA MUSCICAPIDAE	
SUBFAMÍLIA TURDINAE	
<i>Turdus rufiventris</i> (sabiá-laranjeira)	F, Cp, Aa, E
<i>Turdus amaurochalinus</i> (sabiá-poca)	F, Cp, E
<i>Turdus albicollis</i> (sabiá-coleira)	F, Cp, E
FAMÍLIA MIMIDAE	
<i>Mimus saturninus</i> (sabiá-do-campo)	C, E
FAMÍLIA MOTACILLIDAE	
<i>Anthus</i> sp. (caminheiro)	C, E
FAMÍLIA VIREONIDAE	
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (pitiguari)	F, Cp, Aa, E
FAMÍLIA EMBERIZIDAE	
<i>Parula pitiayumi</i> (mariquita)	Cp, Aa, E
<i>Basileuterus culicivorus</i> (pula-pula)	F, Cp, E
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (pula-pula-assobiador)	F, Cp, E
<i>Thraupis sayaca</i> (sanhaço-cinzento)	F, Cp, Aa, E
<i>Stephanophorus diadematus</i> (sanhaço-frade)	F, Cp, E
<i>Zonotrichia capensis</i> (tico-tico)	C, Cp, Aa, E
<i>Poospiza lateralis</i> (quete)	F, Cp, E
<i>Sicalis flaveola</i> (canário-da-terra-verdadeiro)	C, Cp, Aa, E
<i>Volatinia jacarina</i> (tiziú)	C, Cp, E
<i>Sporophila caerulea</i> (coleirinho)	C, Cp, E
<i>Saltator similis</i> (trinca-ferro-verdadeiro)	F, Cp, Aa, E
SUBFAMÍLIA ICTERINAE	
<i>Cacicus haemorrhous</i> (guaxe)	F, Cp, E
<i>Cacicus chrysopterus</i> (tecelão)	F, Cp, Aa, E
<i>Gnorimopsar chopi</i> (melro)	C, Aa, E
<i>Molothrus bonariensis</i> (chopim)	C, Aa, E

Total de espécies: 99, sendo 17 Ordens, 36 Famílias, 47 nNão Passeriformes e 52 Passeriformes, dos quais 28 Suboscines e 24 Oscines. Legenda: (A) Ambiente aéreo, (Aa) áreas alteradas, (B) brejos (C) campo, (Cp) capoeira, (F) Floresta, (R) margem de rio, (E) entorno.