

**Anexo 3.06 - Lista de Espécies Registradas no PESC e Entorno  
Consolidada a Partir de Benedito-Cecílio et al. (1997)  
e Vazzoler et al.(2004)**

<b>ESPÉCIES/AMBIENTE</b>	<b>PIQ</b>	<b>CIU</b>
OSTHEICHTHYES		
CHARACIFORMES		
CHARACIDAE		
<i>Acestrorhynchus lacustris</i> (Reinhardt, 1874)	+	
<i>Astyanax altiparanae</i> Garutti & Britski, 2000	+	
<i>Astyanax fasciatus</i> (Cuvier, 1819)	+	
<i>Astyanax schubarti</i> Britski, 1964	+	
<i>Brycon orbignyanus</i> (Valenciennes, 1849)	+	
<i>Bryconamericus</i> spp.	+	
<i>Bryconamericus stramineus</i> Eigenmann, 1908	+	
<i>Galeocharax kneri</i> Steindachner, 1878	+	
<i>Moenkhausia intermedia</i> Eigenmann, 1908	+	
<i>Myloplus cf tiete</i> (Eigenmann & Norris, 1900)	+	
<i>Odontostilbe</i> sp.	+	
<i>Piabina argentea</i> Reinhardt, 1866	+	
<i>Salminus hilarii</i> Valenciennes, 1849	+	
<i>Salminus maxillosus</i> Valenciennes, 1849	+	
<i>Serrasalmus spilopleura</i> Kner, 1858	+	
CRENUCHIDAE		
<i>Characidium</i> sp.		+
ANOSTOMIDAE		
<i>Leporellus vittatus</i> (Valenciennes, 1849)	+	
<i>Leporinus amblyrhynchus</i> Garavello & Britski, 1987	+	
<i>Leporinus friderici</i> (Bloch, 1794)	+	
<i>Leporinus obtusidens</i> (Valenciennes, 1836)	+	
<i>Leporinus octofasciatus</i> Steindachner, 1815	+	
<i>Leporinus</i> sp.	+	
<i>Leporinus striatus</i> Kner, 1858	+	
<i>Schizodon borellii</i> (Boulenger, 1900)	+	
<i>Schizodon nasutus</i> Kner, 1858	+	
PARODONTIDAE		
<i>Apareiodon affinis</i> (Steindachner, 1879)	+	
<i>Apareiodon piracicabae</i> (Eigenmann, 1907)	+	
CURIMATIDAE		
<i>Cyphocharax modestus</i> (Fernández-Yépez, 1948)	+	
<i>Cyphocharax nagelii</i> (Steindachner, 1881)	+	
<i>Steindachnerina insculpta</i> (Fernández-Yépez, 1948)	+	

<b>ESPÉCIES/AMBIENTE</b>	<b>PIQ</b>	<b>CIU</b>
PROCHILODONTIDAE		
<i>Prochilodus lineatus</i> (Valenciennes, 1836)	+	
ERYTHRINIDAE		
<i>Hoplias lacerdae</i> Ribeiro, 1908 <sup>1</sup>	+	
<i>Hoplias</i> aff. <i>malabaricus</i> (Bloch, 1794)	+	+
LEBIASINIDAE		
CYNODONTIDAE		
GYMNOTIFORMES		
GYMNOTIDAE		
<i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus, 1758	+	
<i>Gymnotus sylvius</i> Albert & Fernandes-Matioli, 1999	+	
Sternopygidae		
<i>Sternopygus macrurus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	+	
APTERONOTIDAE		
<i>Apteronotus albifrons</i> (Linneus, 1766)	+	
<i>Apteronotus brasiliensis</i> (Reinhardt, 1852)	+	
SILURIFORMES		
AUCHENIPTERIDAE		
<i>Auchenipterus osteomystax</i> (Ribeiro, 1918) <sup>D</sup>	+	
<i>Tatia neivai</i> (Ihering, 1930)	+	
PIMELODIDAE		
<i>Iheringichthys labrosus</i> (Lütken, 1874)	+	
<i>Megalonema platanus</i> (Günther, 1880)	+	
<i>Pimelodella gracilis</i> (Valenciennes, 1836)	+	
<i>Pimelodus</i> cf. <i>absconditus</i> Azpelicueta, 1995	+	
<i>Pimelodus maculatus</i> Lacépède, 1803	+	
<i>Pseudopimelodus mangurus</i> (Valenciennes, 1840)	+	
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i> (Agassiz, 1829)	+	
<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	+	
<i>Steindachneridion</i> cf. <i>scripta</i> (Ribeiro, 1918)	+	
TRICHOMYCTERIDAE		
<i>Trichomycterus</i> spp.	+	
LORICARIIDAE		
<i>Hypostomus</i> spp.	+	
<i>Megalancistrus aculeatus</i> (Perugia, 1891)	+	
CYPRINODONTIFORMES		
POECILIIDAE		
<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868) <sup>1</sup>		
SYNBRANCHIFORMES		
SYNBRANCHIDAE		
<i>Synbranchus marmoratus</i> Bloch, 1795		+

<b>ESPÉCIES/AMBIENTE</b>	<b>PIQ</b>	<b>CIU</b>
<b>PERCIFORMES</b>		
<b>CICHLIDAE</b>		
<i>Cichlasoma paranaense</i> Kullander, 1983	+	
<i>Crenicichla britskii</i> Kullander, 1982	+	
<i>Crenicichla haroldoi</i> Luengo & Britski, 1974	+	
<i>Crenicichla nierderleinii</i> (Holmberg, 1891)	+	
<i>Crenicichla</i> sp.	+	+
<i>Oreochromis</i> sp <sup>1</sup> .		+
<b>CYPRINIDAE</b>		
<i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1</sup>	+	
<b>Número de espécies</b>	<b>54</b>	<b>6</b>

Legenda: SCA = Rio São Camilo; CIU = Corpos d'água do Interior e Limítrofes à Unidade de Conservação.<sup>1</sup> = Espécies Introduzidas de Outras Bacias; <sup>D</sup> = Espécies Dispersadas do Médio Rio Paraná Após a Formação do Reservatório de Itaipu.

A Classificação é Baseada em Britski e. al. (1999).