

Anexo 3.05 - Aves Registradas e/ou Esperadas para o Parque Estadual da Serra da Baitaca

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
TINAMIFORMES		
Tinamidae		
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	--
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuguaçu	N4, N2, S4, S5
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	--
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz	--
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	codorna	--
ANSERIFORMES		
Anatidae		
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	--
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho	--
<i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1756)	marreca-de-bico-roxo	--
GALLIFORMES		
Cracidae		
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuaçu	S4
<i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga	--
Odontophoridae		
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	--
PODICIPEDIFORMES		
Podicipedidae		
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno	--
SULIFORMES		
Phalacrocoracidae		
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
PELECANIFORMES		
Ardeidae		
<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	socó-boi-escuro	--
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	--
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	--
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	--
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	--
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	--
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	--
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	--
Threskiornithidae		
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	--
CATHARTIFORMES		
Cathartidae		
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	N1, N2
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	N1, N2, N4, N5, N7
ACCIPITRIFORMES		
Accipitridae		
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	--
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	N1, N2, N4, S3, S4
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	--
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	--
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado	--
<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1818	gavião-miúdo	--
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande	--
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	--
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Accipitridae		
<i>Parabuteo leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	gavião-de-sobre-branco	--
<i>Pseudastur polionotus</i> (Kaup, 1847)	gavião-pombo-grande	--
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	--
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	N6
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	--
<i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838	gavião-papa-gafanhoto	--
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real	--
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	--
<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato	--
FALCONIFORMES		
Falconidae		
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	--
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	S1, S2
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	--
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	--
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	--
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	--
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-coleira	--
GRUIFORMES		
Rallidae		
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	--
<i>Laterallus leucopyrrhus</i> (Vieillot, 1819)	sanã-vermelha	--
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	--
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	--
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	frango-d'água	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
CHARADRIIFORMES		
Charadriidae		
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	--
Scolopacidae		
<i>Gallinago paraguaiæ</i> (Vieillot, 1816)	narceja	--
Jacanidae		
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	--
COLUMBIFORMES		
Columbidae		
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	--
<i>Claravis geoffroyi</i> (Temminck, 1811)	pararu-espelho	--
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	N6
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaterre, 1792)	pomba-galega	--
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	S1, S2, N4, N5, S4
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	--
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	--
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	pariri	--
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	--
PSITTACIFORMES		
Psittacidae		
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	S1, S2, N4, N5, N7 S4
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	N4, N5, N7 S4
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	--
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	N2, S4
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	--
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	papagaio-de-peito-roxo	--
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Psittacidae		
<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	--
CUCULIFORMES		
Cuculidae		
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	--
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado	--
<i>Coccyzus euleri</i> (Cabanis, 1783)	papa-lagarta-de-euler	--
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	--
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	--
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	--
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino	--
STRIGIFORMES		
Tytonidae		
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	--
Strigidae		
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1819)	corujinha-do-mato	--
<i>Megascops sanctaecatharinae</i> (Salvin, 1897)	corujinha-do-sul	--
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu	--
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela	--
<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada	--
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato	--
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	--
<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	--
CAPRIMULGIFORMES		
Nyctibiidae		
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Caprimulgidae		
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	--
<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1819)	corucão	--
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	--
<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-chintã	--
<i>Caprimulgus longirostris</i> (Bonaparte, 1825)	bacurau-da-telha	--
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura	--
<i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesoura-gigante	--
<i>Eleothreptus anomalus</i> (Gould, 1838)	curiango-do-banhado	--
APODIFORMES		
Apodidae		
<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	taperuçu-preto	--
<i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)	taperuçu-velho	--
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	N1
<i>Streptoprocne biscutata</i> (Sclater, 1866)	taperuçu-de-coleira-falha	--
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	taperuçu-de-sobre-cinza	N4, N5, N7, S3, S4
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	S3
Trochilidae		
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	S2
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	--
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	--
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	--
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta	--
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	--
<i>Stephanoxis lalandi</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-topete	S2, N2, N3
<i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817)	topetinho-vermelho	--
<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Trochilidae		
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	--
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	N6
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	S1, S2, S3, S4, N2, N3, N6
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	--
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	--
<i>Clytolaema rubicauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi	--
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista	--
TROGONIFORMES		
Trogonidae		
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	S2, S3, S4, N2, N3, N4, N5, N6
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela	--
CORACIIFORMES		
Alcedinidae		
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	S4
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	--
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	S3
Momotidae		
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	--
GALBULIFORMES		
Bucconidae		
<i>Notharchus swainsoni</i> (Gray, 1846)	macuru-de-barriga-castanha	--
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado	--
<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	macuru	--
PICIFORMES		
Ramphastidae		
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	S2, S3, N2, N3, N4, N5, S4

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Ramphastidae		
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	--
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	--
Picidae		
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira	N4, S4
<i>Picumnus nebulosus</i> Sundevall, 1866	pica-pau-anão-carijó	--
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	--
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1816)	pica-pau-de-testa-amarela	--
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	S2, N6
<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado	--
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	N2
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	--
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	--
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	--
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	pica-pau-rei	--
PASSERIFORMES		
Thamnophilidae		
<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	S2
<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-de-garganta-pintada	--
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	--
<i>Dysithamnus xanthopterus</i> (Burmeister, 1856)	choquinha-de-asa-ferrugem	--
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho	--
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	S2, S4, N2, N3, N4, N5, N7
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	--
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	N2, N6
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	S2, N2, N3
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Thamnophilidae		
<i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850)	papo-branco	--
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	N4
<i>Drymophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	trovoada-de-bertoni	--
<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho	--
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	N6
Conopophagidae		
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	S2, N2, N6
Grallariidae		
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	--
<i>Hylopezus nattereri</i> (Pinto, 1937)	pinto-do-mato	--
Rhinocryptidae		
<i>Merulaxis ater</i> Lesson, 1830	entufado	--
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	S2, S3, S4, N6
<i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétriès, 1835)	tapaculo-preto	--
<i>Scytalopus iraiensis</i> Bornscheim et al., 1998	macuquinho-da-várzea	--
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétriès, 1835)	tapaculo-pintado	--
Formicariidae		
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	--
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha	--
<i>Chamaeza meruloides</i> Vigors, 1825	tovaca-cantadora	--
<i>Chamaeza ruficauda</i> (Cabanis & Heine, 1859)	tovaca-de-rabo-vermelho	--
Scleruridae		
<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	S2
Dendrocolaptidae		
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	N2, N3, N4, S2, S4, S5
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	N2, N4

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Dendrocolaptidae		
<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)	arapaçu-de-bico-torto	--
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	arapaçu-escamoso-do-sul	S2, S4
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande	--
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	--
Furnariidae		
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo	--
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	--
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	--
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	S2
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	--
<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	trepador-coleira	--
<i>Philydor lichtensteini</i> Cabanis & Heine, 1859	limpa-folha-ocráceo	--
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	--
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia	N2, N4, N6
<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	trepadorzinho	--
<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	--
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete	N4, N6
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i> P. L. Sclater & Salvin, 1873	cisqueiro	N6
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830)	trepador-sobrancelha	--
<i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824)	grimpeiro	N4
<i>Leptasthenura striolata</i> (Pelzelin, 1856)	grimpeirinho	--
<i>Phacellodomus striaticollis</i> (d'Orbigny & Lafr., 1838)	tio-tio	--
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	--
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	N2, N4, N5, N6, S3, S4, S5
<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	pi-puí	N1
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	N2

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Furnariidae		
<i>Cranioleuca obsoleta</i> (Reichenbach, 1853)	arredio-oliváceo	N4, N6, S3
<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	--
Pipridae		
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho	--
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	S2, S4, N4, N5, N6
Tityridae		
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto	--
<i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858)	maria-leque-do-sudeste	--
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	N2, N3, N4, S2, S4, S5
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda	--
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto	--
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	--
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro	N4
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	--
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	--
Cotingidae		
<i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)	tropeiro-da-serra	--
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	N2, N3, N4, N5, N6, N7, S2, S4, S5
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	--
<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó	N2, N3, N4, N5, N6, N7, S2, S3, S4, S5
<i>Carpornis melanocephala</i> (Wied, 1820)	sabiá-pimenta	--
Rhynchocyclidae		
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asas-de-cabeça-cinza	--
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	--
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato	--
<i>Phylloscartes paulista</i> Ihering & Ihering, 1907	não-pode-parar	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Rhynchocyclidae		
<i>Phylloscartes difficilis</i> (Inhering & Ihering, 1907)	estalinho	--
<i>Phylloscartes sylviolus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	maria-pequena	--
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	--
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	--
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	N2, N4, N6, S2, S3
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	S2
<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	--
<i>Hemitriccus obsoletus</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)	catraca	N2
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	--
Tyrannidae		
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro	--
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	S2, N2, N6
<i>Tyranniscus burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859	piolhinho-chiador	--
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	--
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto	--
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque	--
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1859)	tucão	--
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta	--
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada	--
<i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824)	piolhinho-verdoso	S2
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	N4, S2, S3
<i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817)	joão-pobre	S3
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	S2
<i>Platyrinchus leucoryphus</i> Wied, 1831	patinho-gigante	--
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	S4
<i>Piprites pileata</i> (Temminck, 1822)	caneleirinho-de-chapeu-preto	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Tyrannidae		
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	--
<i>Attila phoenicurus</i> Pelzeln, 1868	capitão-castanho	--
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	--
<i>Ramphotrigon megacephalum</i> (Swainson, 1835)	maria-cabeçuda	--
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	--
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	--
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador	--
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	N3, N4, N5, N6, N7, S2, S4, S5
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	--
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	--
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei, bem-te-vi	--
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	--
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	--
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	--
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	--
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	--
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	S3
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	--
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	--
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	N4, S2
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento	--
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado	--
<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-garganta-vermelha	--
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	--
<i>Muscippra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Vireonidae		
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	N2, N3, N4, N5, N6, N7, S2, S3, S4, S5
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	N2, N3, N4, N5, N6, N7, S2, S3, S4, S5
<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	N2, N3, S5
Corvidae		
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	S4
Hirundinidae		
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	--
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	S3
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	--
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	S3
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	--
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	--
Troglodytidae		
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	N7, S3
Poliophtilidae		
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assoavelado	--
Turdidae		
<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una	N2, N3, N4, N5, N6, N7, S2, S3, S4, S5
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	N2, N3, N4, N5, N6, N7, S2, S3, S4, S5
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	--
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	--
<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	--
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	N4
Mimidae		
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Motacillidae		
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	--
<i>Anthus hellmayri</i> Hartert, 1909	caminheiro-de-barriga-acanelada	--
Coerebidae		
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	--
Thraupidae		
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	pimentão	--
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	N2, N6, S2, S3
<i>Saltator maxillosus</i> Cabanis, 1851	bico-grosso	--
<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo	--
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	--
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	--
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	cabecinha-castanha	--
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	N2, S3
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	S2, N4
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	N2, N4, S3, S5
<i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-encontro-azul	--
<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	--
<i>Thraupis bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	sanhaçu-papa-laranja	--
<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	sanhaçu-frade	S1, S2, N6
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	N2, N6
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	--
<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-militar	--
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta	S4, S5, N2
<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	saíra-preciosa	--
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	--
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul, saíra-azul	--

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Thraupidae		
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	--
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto	N4
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	--
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	--
Emberizidae		
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	N3, N5
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	--
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	--
<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	tico-tico-do-brejo	--
<i>Poospiza thoracica</i> (Nordmann, 1835)	peito-pinhão	--
<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafr., 1837)	quem-te-vestiu	--
<i>Poospiza cabanisi</i> (Bonaparte, 1850)	tico-tico-da-taquara	--
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	--
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo	--
<i>Emberizoides ypiranganus</i> Ihering & Ihering, 1907	canário-do-brejo	--
<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789)	sabiá-do-banhado	--
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	--
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	--
<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra-verdadeira	--
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	--
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	--
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro	--
<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	tico-tico-do-mato	--
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei	--
Cardinalidae		
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	N4, S4

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	PONTOS DA AER COM REGISTRO
Cardinalidae		
<i>Cyanoloxia moesta</i> (Hartlaub, 1853)	negrinho-do-mato	--
<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	azulão	--
<i>Cyanoloxia glaucocerulea</i> (d'Orb. & Lafr., 1837)	azulinho	--
Parulidae		
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	N2, N4, S4, S5
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	--
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	N2, N4, N5, S2, S3, S4, S5
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	N2, N4, N5, S2, S3, S4, S5
Icteridae		
<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	tecelão	--
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	--
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chopim-do-brejo	--
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	--
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	--
Fringillidae		
<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	--
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	--
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	--
<i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825)	cais-cais	N2
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei	--
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	--
<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	gaturamo-bandeira	--
Estrildidae		
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	--
Passeridae		
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	--

