

ANEXO 2b - FITOSSOCIOLOGIA DA TIPOLOGIA FLORESTA INUNDÁVEL NO PARQUE ESTADUAL POR AVALIAÇÃO
ECOLÓGICA RÁPIDA

ESPÉCIE	NOME VULGAR	N	AB ABS	D ABS	FR ABS	AB REL
		IND.	IND./ha	m ² /ha	%	%
Cipó		12	600,00	2,93	100,00	29,27
Mimosaceae 01		1	50,00	9,56	100,00	2,44
NI		2	100,00	2,82	100,00	4,88
<i>Bauhinia</i> sp.		2	100,00	2,34	100,00	4,88
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>	Aguaiá, Peroba-branca	1	50,00	2,87	100,00	2,44
<i>Trichilia catigua</i>	Catiguá	3	150,00	1,37	100,00	7,32
<i>Actinostemon concolor</i>		4	200,00	0,41	100,00	9,76
<i>Lonchocarpus guillemineanus</i>	Rabo-de-bugio	2	100,00	1,52	100,00	4,88
<i>Cupania vernalis</i>	Camboatá	2	100,00	1,22	100,00	4,88
<i>Ocotea elegans</i>	Canela-ferro	3	150,00	0,42	100,00	7,32
Mortas		2	100,00	0,57	100,00	4,88
<i>Eugenia</i> 01		2	100,00	0,25	100,00	4,88
<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Guabiroba	1	50,00	0,65	100,00	2,44
<i>Ruprechtia laxiflora</i>	Farinha-seca	1	50,00	0,46	100,00	2,44
<i>Plinia rivularis</i>		1	50,00	0,33	100,00	2,44
<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	1	50,00	0,30	100,00	2,44
Verbenaceae 01		1	50,00	0,28	100,00	2,44
TOTAL		41	2.050,00	28,31	1.700,00	100,00

Legenda: N Ind.: número de indivíduos
 AB Abs: abundância absoluta em ind./ha
 D Abs: dominância absoluta em m² / ha
 FR Abs: frequência absoluta em %
 AB Rel: abundância relativa em %