

ANEXO 2c - FITOSSOCIOLOGIA DA TIPOLOGIA FLORESTA SECUNDÁRIA MISTA COM ESPÉCIES NATIVAS E *MELIA AZEDARACH* NO PARQUE ESTADUAL
 POR AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA

ESPÉCIE	NOME VULGAR	N	AB ABS	D ABS	FR ABS	AB REL	D REL	FR REL	I V C	I V I
		IND.	IND./ha	m ² /ha	%	%	%	%	% 0-200	% 0-300
<i>Lonchocarpus muehlbergianus</i>	Guaianã, Rabo-de-bugio	11	550,00	12,77	100,00	40,74	49,30	20,00	90,04	110,04
<i>Melia azedarach</i>	Santa-Bárbara, Cinamomo	12	600,00	8,40	100,00	44,44	32,44	20,00	76,88	96,88
Morta		1	50,00	4,39	100,00	3,70	16,94	20,00	20,64	40,64
<i>Parapiptadenia rigida</i>	Angico	2	100,00	0,25	100,00	7,41	0,98	20,00	8,38	28,38
<i>Zanthoxylum riedelianum</i>	Mamica-de-porca	1	50,00	0,09	100,00	3,70	0,35	20,00	4,05	24,05
TOTAL		27	1.350,00	25,90	500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00

Legenda: N Ind.: número de indivíduos
 D Abs: dominância absoluta em m² / ha
 AB Rel: abundância relativa em %
 FR Rel: :frequência relativa em %
 IVI: valor de importância (valor máximo = 300)

AB Abs: abundância absoluta em ind./ha
 FR Abs: frequência absoluta em %
 D Rel: dominância relativa em %
 IVC: valor de cobertura (valor máximo = 200)