

ANEXO 2d - FITOSSOCIOLOGIA DA TIPOLOGIA REFLORESTAMENTO DE ESPÉCIES NATIVAS NO PARQUE ESTADUAL POR AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA

ESPÉCIE	NOME VULGAR	N	AB ABS	D ABS	FR ABS	AB REL	D REL	FR REL	I V C	I V I
		IND.	IND./ha	m ² /ha	%	%	%	%	% 0-200	% 0-300
<i>Parapiptadenia rigida</i>	Angico	6	300,00	5,50	100,00	27,27	35,58	14,29	62,85	77,14
<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	4	200,00	5,12	100,00	18,18	33,10	14,29	51,28	65,57
<i>Colubrina glandulosa</i>	Sobrasil	3	150,00	2,44	100,00	13,64	15,79	14,29	29,42	43,71
<i>Tabebuia heptaphylla</i>	Capixingui	4	200,00	1,23	100,00	18,18	7,96	14,29	26,14	40,43
<i>Croton floribundus</i>	Ipê-roxo	2	100,00	0,54	100,00	9,09	3,50	14,29	12,59	26,88
<i>Alchornea triplinervia</i>	Tapiá	2	100,00	0,53	100,00	9,09	3,42	14,29	12,51	26,80
<i>Mortas</i>		1	50,00	0,10	100,00	4,55	0,66	14,29	5,20	19,49
TOTAL		22	1.100,00	15,47	700,00	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00

Legenda: N Ind.: número de indivíduos

AB Abs: abundância absoluta em ind./ha

D Abs: dominância absoluta em m² / ha

FR Abs: frequência absoluta em %

AB Rel: abundância relativa em %

D Rel: dominância relativa em %

FR Rel: :frequência relativa em %

IVC: valor de cobertura (valor máximo = 200)

IVI: valor de importância (valor máximo = 300)