# ANEXO – LISTA DE FAUNA

***Lista de mamíferos de confirmada ou supositiva ocorrência no Parque Estadual do Monge, com indicadores ecológicos (ECO), biogeográficos (BG) e de conservação (CONS).***

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | IUCN | BR | PR |
| CARNIVORA | | | | | | | | | |
| CANIDAE | | | | | | | | | |
| *Cerdocyon thous* | cachorro-do-mato | T | TE | | | | | | |
| *Chrysocyon brachyurus* | lobo-guará | T | TE | EC | | | | VU | EN |
| *Lycalopex gymnocercus* | graxaim-do-campo | T | TE | CS | | | | | |
| MUSTELIDAE | | | | | | | | | |
| *Eira barbara* | irara | T | TE | | | | | | |
| *Galictis cuja* | furão-pequeno | T | TE | | | | | | |
| PROCYONIDAE | | | | | | | | | |
| *Nasua nasua* | quati | T | ES | | | | | | |
| *Procyon cancrivorus* | mão-pelada | T | TE | BR | | | | | |
| FELIDAE | | | | | | | | | |
| *Herpailurus yagouaroundi* | jaguarundi | T | TE | | | | | VU | VU |
| *Leopardus guttulus* | gato-do-mato-pequeno | T | ES | | x | x | VU | VU | VU |
| *Leopardus pardalis* | jaguatirica | T | ES | | | | | | VU |
| *Leopardus wiedii* | gato-maracajá | T | ES | | | | | VU | EN |
| *Puma concolor* | puma | T | TE | | | | | VU | VU |
| *Panthera onca* | onça-pintada | T | TE | | | | | VU | CR |
| CETARTIODACTYLA | | | | | | | | | |
| CERVIDAE | | | | | | | | | |
| *Mazama rufa* | veado-mateiro | T | TE | | | | | | VU |
| *Subulo gouazoubira* | veado-catingueiro | T | TE | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | IUCN | BR | PR |
| *Mazama nana* | veado-cambuta | T | TE | | x | | | VU | VU |
| *Ozotoceros bezoarticus* | veado-campeiro | T | TE | CS | | | | | CR |
| TAYASSUIDAE | | | | | | | | | |
| *Dicotyles tajacu* | cateto | T | TE | | | | | | EN |
| SUIDAE | | | | | | | | | |
| *Sus scrofa* exo | porco-doméstico | T | TE | | | | | | |
| CHIROPTERA | | | | | | | | | |
| MOLOSSIDAE | | | | | | | | | |
| *Cynomops abrasus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Eumops auripendulus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Molossus molossus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Molossus rufus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Nyctinomops laticaudatus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Promops nasutus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Tadarida brasiliensis* | morcego | V | AE | | | | | | |
| NOCTILIONIDAE | | | | | | | | | |
| *Noctilio albiventris* | morcego-pescador-pequeno | V | AE | CAF | | | | | |
| *Noctilio leporinus* | morcego-pescador-grande | V | AE | CAF | | | | | |
| PHYLLOSTOMIDAE | | | | | | | | | |
| *Carollia perspicillata* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Desmodus rotundus* | morcego-vampiro | V | AE | | | | | | |
| *Diaemus youngii* | morcego-vampiro | V | AE | | | | | | |
| *Diphylla ecaudata* | morcego-vampiro | V | AE | | | | | | |
| *Anoura caudifer* | morcego-beija-flor | V | AE | | | | | | |
| *Anoura geoffroyi* | morcego-beija-flor | V | AE | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | IUCN | BR | PR |
| *Glossophaga soricina* | morcego-beija-flor | V | AE | | | | | | |
| *Tonatia bidens* | morcego-caçador | V | AE | | | | | | |
| *Chrotopterus auritus* | morcego-caçador | V | AE | | | | | | |
| *Artibeus (Artibeus) fimbriatus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Artibeus (Artibeus) lituratus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Artibeus (Artibeus) planirostris* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Platyrrhinus lineatus* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Pygoderma bilabiatum* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Vampyressa pusilla* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Sturnira (Sturnira) lilium* | morcego-flor-de-lis | V | AE | | | | | | |
| VESPERTILIONIDAE | | | | | | | | | |
| *Myotis albescens* | morcego-borboleta | V | AE | | | | | | |
| *Myotis levis* | morcego-borboleta | V | AE | | | | | | |
| *Myotis nigricans* | morcego-borboleta | V | AE | | | | | | |
| *Myotis riparius* | morcego-borboleta | V | AE | | | | | | |
| *Myotis ruber* | morcego-borboleta | V | AE | | | | | | |
| *Neoeptesicus brasiliensis* | morcego-borboleta | V | AE | | | | | | |
| *Neoeptesicus diminutus* | morcego-borboleta | V | AE | | | | | | |
| *Neoeptesicus furinalis* | morcego-borboleta | V | AE | | | | | | |
| *Histiotus velatus* | morcego-orelhudo | V | AE | | | | | | |
| *Lasiurus (Aeorestes) egregius* | morcego | V | AE | | | | | | |
| *Lasiurus (Aeorestes) villosissimus* | morcego-lanoso | V | AE | | | | | | |
| *Lasiurus (Lasiurus) blossevillii* | morcego-taturana | V | AE | | | | | | |
| CINGULATA | | | | | | | | | |
| DASYPODIDAE | | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | IUCN | BR | PR |
| *Dasypus (Dasypus) novemcinctus* | tatu-galinha | T | FS | | | | | | |
| *Dasypus (Muletia) septemcinctus* | tatu-mulita | T | FS | | | | | | |
| CHLAMYPHORIDAE | | | | | | | | | |
| *Euphractus sexcinctus* | tatu-peba | T | FS | | | | | | |
| *Cabassous tatouay* | tatu-de-rabo-mole-grande | T | FS | | | | | | |
| DIDELPHIMORPHIA | | | | | | | | | |
| DIDELPHIDAE | | | | | | | | | |
| *Caluromys lanatus* | cuíca-lanosa | T | AR | | | | | | |
| *Caluromys philander* | cuíca-lanosa | T | AR | | | | | | |
| *Chironectes minimus* | cuíca-d'água | T | SA | CAF | | | | | |
| *Didelphis albiventris* | gambá-de-orelha-branca | T | ES | | | | | | |
| *Didelphis aurita* | gambá-de-orelha-preta | T | ES | | | x | | | |
| *Lutreolina crassicaudata* | cuíca-de-cauda-grossa | T | ES | CH | | | | | |
| *Marmosa (Micoureus) paraguayana* | cuíca | T | ES | | | | | | |
| *Monodelphis (Microdelphys) americana* | cuíca-de-três-listras | T | TE | | | | | | |
| *Monodelphis (Monodelphiops) dimidiata* | catita | T | TE | | | | | | |
| *Marmosops (Marmosops) incanus* | cuíca | T | ES | | x | | | | |
| *Gracilinanus microtarsus* | cuíca | T | AR | | x | x | | | |
| LAGOMORPHA | | | | | | | | | |
| LEPORIDAE | | | | | | | | | |
| *Sylvilagus brasiliensis* | tapiti | T | TE | | | | | | |
| *Lepus europaeus* exo | lebre | T | TE | CS | | | | | |
| PERISSODACTYLA | | | | | | | | | |
| TAPIRIDAE | | | | | | | | | |
| *Tapirus terrestris* | anta | T | TE | BR | | | | VU | CR |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | IUCN | BR | PR |
| PILOSA | | | | | | | | | |
| MYRMECOPHAGIDAE | | | | | | | | | |
| *Myrmecophaga tridactyla* | tamanduá-bandeira | T | TE | EC | | | | | CR |
| *Tamandua tetradactyla* | tamanduá-mirim | T | ES | | | | | | |
| PRIMATES | | | | | | | | | |
| ATELIDAE | | | | | | | | | |
| *Alouatta guariba* * | bugio | T | AR | DO | | | | VU | CR |
| CEBIDAE | | | | | | | | | |
| *Sapajus nigritus* | macaco-prego-preto | T | AR | DO | | x | | | |
| RODENTIA | | | | | | | | | |
| CAVIIDAE | | | | | | | | | |
| *Cavia aperea* | preá | T | TE | CH | | | | | |
| *Hydrochoerus hydrochaeris* | capivara | T | SA | BR | | | | | |
| CUNICULIDAE | | | | | | | | | |
| *Cuniculus paca* | paca | T | TE | CAF | | | | | VU |
| DASYPROCTIDAE | | | | | | | | | |
| *Dasyprocta azarae* | cutia | T | TE | | | | | | |
| ECHIMYIDAE | | | | | | | | | |
| *Kannabateomys amblyonyx* | rato-da-taquara | T | AR | BB | | | | | |
| *Phyllomys dasythrix* | rato-da-árvore | T | AR | | x | x | | | |
| *Phyllomys medius* | rato-da-árvore | T | AR | | x | x | | | CR |
| ERETHIZONTIDAE | | | | | | | | | |
| *Coendou spinosus* | ouriço-cacheiro | T | AR | DO | | | | | |
| CRICETIDAE | | | | | | | | | |
| *Delomys dorsalis* | rato-do-mato | T | TE | | | x | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | IUCN | BR | PR |
| *Delomys sublineatus* | rato-do-mato | T | TE | | | x | | | |
| *Akodon montensis* | rato-do-chão | T | TE | | | | | | |
| *Akodon paranaensis* | rato-do-chão | T | TE | | | x | | | |
| *Akodon sanctipaulensis* | rato-do-chão | T | TE | | x | x | | | |
| *Bibimys labiosus* | rato-do-chão | T | TE | | | x | | | |
| *Brucepattersonius iheringi* | rato-do-chão | T | SF | | x | x | | | |
| *Necromys lasiurus* | rato-do-mato | T | TE | | | | | | |
| *Oxymycterus quaestor* | rato-quati | T | SF | | | x | | | |
| *Scapteromys meridionalis* | rato-d'água | T | SA | | | | | | CR |
| *Euryoryzomys russatus* | rato-do-mato | T | TE | | | x | | | |
| *Holochilus brasiliensis* | rato-d'água | T | SA | | | | | | |
| *Nectomys squamipes* | rato-d'água | T | SA | | | | | | |
| *Oecomys catherinae* | rato-da-árvore | T | AR | | | | | | |
| *Oligoryzomys flavescens* | rato-do-mato | T | ES | | | | | | |
| *Oligoryzomys nigripes* | rato-do-mato | T | ES | | | | | | |
| *Sooretamys angouya* | rato-do-mato | T | TE | | | x | | | |
| *Juliomys pictipes* | rato-do-mato | T | AR | | | x | | | |
| MURIDAE | | | | | | | | | |
| *Mus musculus* exo | camundongo | T | ES | | | | | | |
| *Rattus rattus* exo | rato-doméstico | T | ES | | | | | | |
| *Rattus norvegicus* exo | ratazana | T | ES | | | | | | |
| SCIURIDAE | | | | | | | | | |
| *Guerlinguetus brasiliensis* | serelepe | T | AR | DO | | | | | |

**Legenda: Indicadores ecológicos (ECO):** TE, tipo ecológico (T, terrestre; A, aquático; V, voadora); DES, deslocamento (NA, natante, AS, semiaquática, ES, escansorial, AR, arborícola, TE, terrícola, SF, semifossorial, FS, fossorial, AE, aerícola); HE, uso de hábitats especiais (CAF, corpos d'água florestais; CH, campos úmidos; CS, campos secos; DO, dossel e copa; BB, bambuzais; EC, ambiente estépico-savânico com cupinzeiros; AR, afloramentos rochosos e cavernas; BR, beira de rios, matas ripícolas); **Indicadores biogeográficos (BG)**: BR,

endêmica do Brasil; MA, endêmica da Mata Atlântica; **Indicadores de conservação (CONS):** IUCN (âmbito global); BR (âmbito federal); PR (âmbito estadual) nas categorias: CR(PRW), Criticamente em Perigo (Possivelmente Extinta na Natureza); CR, Criticamente em Perigo; EN, em perigo; VU, vulnerável; LC, menos preocupante. EXO: Espécie exótica.

***Lista de aves de confirmada ou supositiva ocorrência no Parque Estadual do Monge, com indicadores ecológicos (ECO), biogeográficos (BG) e de conservação (CONS).***

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| TINAMIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| TINAMIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Crypturellus obsoletus* | inhambuguaçu | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Crypturellus parvirostris* | inhambu-chororó | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Crypturellus tataupa* | inhambu-chintã | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Rhynchotus rufescens* | perdiz | T | A | | M | | | | | | | | |
| *Nothura maculosa* | codorna-amarela | T | A | | M | | | | | | | | |
| ANSERIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| ANATIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Dendrocygna viduata* | irerê | D | A | | P | | | | | | | | II |
| *Amazonetta brasiliensis* | marreca-ananaí | D | A | | P | | | | | | | | |
| GALLIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| CRACIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Penelope superciliaris* | jacupemba | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Penelope obscura* | jacuguaçu | T | F | | M | | | | | | | | |
| ODONTOPHORIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Odontophorus capueira* | uru | T | F | | G | | x | | | | | | |
| COLUMBIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| COLUMBIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Columba livia exo* | pombo-doméstico | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Patagioenas picazuro* | pomba-asa-branca | T | F | | M | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Patagioenas cayennensis* | pomba-galega | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Patagioenas plumbea* | pomba-amargosa | T | F | | G | | | | | | | Alt | |
| *Geotrygon montana* | pariri | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Leptotila verreauxi* | juriti-pupu | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Leptotila rufaxilla* | juriti-de-testa-branca | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Zenaida auriculata* | avoante | T | G | NI/AG | P | | | | | | | PM | |
| *Claravis pretiosa* | pararu-azul | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Columbina talpacoti* | rolinha-roxa | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Columbina squammata* | rolinha-fogo-apagou | T | G | | P | | | | | | | | |
| CUCULIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| CUCULIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Guira guira* | anu-branco | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Crotophaga ani* | anu-preto | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Tapera naevia* | saci | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Dromococcyx pavoninus* | peixe-frito-pavonino | T | F | | G | | | | | | | | |
| *Piaya cayana* | alma-de-gato | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Coccyzus melacoryphus* | papa-lagarta-acanelado | T | F | | P | | | | | | | | |
| NYCTIBIIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| NYCTIBIIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Nyctibius griseus* | urutau | T | F | | P | | | | | | | | |
| CAPRIMULGIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| CAPRIMULGIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Lurocalis semitorquatus* | tuju | T | F | | M | | | | | | | PM | |
| *Nyctidromus albicollis* | bacurau | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Hydropsalis parvula* | bacurau-chintã | T | A | | P | | | | | | | PM | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Hydropsalis anomala* | curiango-do-banhado | T | A | CH | M | | | | VU | | EN | | |
| *Hydropsalis torquata* | bacurau-tesoura | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Hydropsalis forcipata* | bacurau-tesourão | T | F | | M | | x | | | | | | |
| APODIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| APODIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Cypseloides fumigatus* | taperuçu-preto | V | F | AR | M | | | | | | | | |
| *Streptoprocne zonaris* | taperuçu-de-coleira-branca | V | G | AR | P | | | | | | | | |
| *Streptoprocne biscutata* | taperuçu-de-coleira-falha | V | G | AR | M | | | | | | | | |
| *Chaetura meridionalis* | andorinhão-do-temporal | V | G | | P | | | | | | | | |
| TROCHILIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Calliphlox amethystina* | estrelinha-ametista | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Chlorostilbon lucidus* | besourinho-de-bico-vermelho | T | F | | P | | | | | | | | |
| GRUIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| RALLIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Pardirallus nigricans* | saracura-sanã | D | A | BH | M | | | | | | | | |
| *Aramides saracura* | saracura-do-mato | D | F | | M | | x | | | | | | |
| CHARADRIIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| CHARADRIIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Vanellus chilensis* | quero-quero | D | G | AG | P | | | | | | | | |
| SULIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| ANHINGIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Anhinga anhinga* | biguatinga | D | A | | M | | | | | | | | |
| PHALACROCORACIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Nannopterum brasilianum* | biguá | D | A | NI/AG | P | | | | | | | Alt | |
| PELECANIFORMES | | | | | | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| ARDEIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Butorides striata* | socozinho | D | A | | P | | | | | | | | |
| *Bubulcus ibis exo* | garça-vaqueira | D | A | | P | | | | | | | Alt | |
| *Ardea cocoi* | garça-moura | D | F | | P | | | | | | | | |
| *Syrigma sibilatrix* | maria-faceira | D | A | | M | | | | | | | | |
| THRESKIORNITHIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Mesembrinibis cayennensis* | coró-coró | D | F | | M | | | | | | | | |
| *Theristicus caudatus* | curicaca | D | A | NI | P | | | | | | | | |
| *Platalea ajaja* | colhereiro | D | A | NI | M | | | | | | | PM | |
| CATHARTIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| CATHARTIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Sarcoramphus papa* | urubu-rei | T | G | | M | | | | | | | PM | |
| *Coragyps atratus* | urubu-preto | T | G | | P | | | | | | | PM | II |
| *Cathartes aura* | urubu-de-cabeça-vermelha | T | G | | P | | | | | | | VN | |
| ACCIPITRIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIPITRIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Elanus leucurus* | gavião-peneira | T | A | | P | | | | | | | PM | |
| *Leptodon cayanensis* | gavião-gato | T | F | | M | | | | | | | Alt | |
| *Elanoides forficatus* | gavião-tesoura | T | F | AG | M | | | | | | | VN | |
| *Spizaetus tyrannus* | gavião-pega-macaco | T | F | | M | | | | | | VU | | |
| *Harpagus diodon* | gavião-bombachinha | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Ictinia plumbea* | sovi | T | F | | M | | | | | | | PM | |
| *Accipiter striatus* | tauató-miúdo | T | F | | M | | | | | | | PM | |
| *Geranospiza caerulescens* | gaviõ-pernilongo | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Heterospizias meridionalis* | gavião-caboclo | T | A | | P | | | | | | | PM | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Urubitinga urubitinga* | gavião-preto | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Rupornis magnirostris* | gavião-carijó | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Parabuteo leucorrhous* | gavião-de-sobre-branco | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Geranoaetus albicaudatus* | gavião-de-rabo-branco | T | A | | P | | | | | | | PM | |
| *Geranoaetus melanoleucus* | águia-serrana | T | A | | M | | | | | | | PM | |
| *Buteo brachyurus* | gavião-de-asa-curta | T | F | | M | | | | | | | PM | |
| STRIGIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| TYTONIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Tyto furcata* | suindara | T | G | | P | | | | | | | | |
| STRIGIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Megascops choliba* | corujinha-do-mato | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Megascops sanctaecatarinae* | corujinha-do-sul | T | F | | P | | x | | | | | | |
| *Strix hylophila* | coruja-listrada | T | F | | G | | x | | | | | | |
| *Athene cunicularia* | coruja-buraqueira | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Asio clamator* | coruja-orelhuda | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Asio flammeus* | mocho-dos-banhados | T | A | CA | P | | | | | | | | |
| TROGONIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| TROGONIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Trogon surrucura* | sucuruá-variado | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Trogon chrysochloros* | | T | F | | M | | x | | | | | | |
| CORACIIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| ALCEDINIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Megaceryle torquata* | martim-pescador-grande | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Chloroceryle amazona* | martim-pescador-verde | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Chloroceryle americana* | martim-pescador-pequeno | T | F | | P | | | | | | | PM | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| GALBULIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| BUCCONIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Nystalus chacuru* | joão-bobo | T | A | | M | | | | | | | | |
| PICIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| RAMPHASTIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Ramphastos dicolorus* | tucano-de-bico-verde | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Pteroglossus bailloni* | araçari-banana | T | F | | G | | x | | | | VU | | |
| PICIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Picumnus temminckii* | picapauzinho-de-coleira | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Picumnus nebulosus* | picapauzinho-carijó | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Melanerpes candidus* | pica-pau-branco | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Veniliornis spilogaster* | pica-pau-verde-carijó | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Campephilus robustus* | pica-pau-rei | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Dryocopus lineatus* | pica-pau-de-banda-branca | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Celeus flavescens* | pica-pau-de-cabeça-amarela | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Piculus aurulentus* | pica-pau-dourado | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Colaptes melanochloros* | pica-pau-verde-barrado | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Colaptes campestris* | pica-pau-do-campo | T | A | | P | | | | | | | Alt | |
| CARIAMIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| CARIAMIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Cariama cristata* | seriema | T | A | | M | | | | | | | | |
| FALCONIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| FALCONIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Herpetotheres cachinnans* | acauã | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Micrastur ruficollis* | falcão-caburé | T | F | | M | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Micrastur semitorquatus* | falcão-relógio | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Caracara plancus* | carcará | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Milvago chimachima* | carrapateiro | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Falco sparverius* | quiriquiri | T | A | | P | | | | | | | PM | |
| *Falco femoralis* | falcão-de-coleira | T | A | | P | | | | | | | PM | |
| PSITTACIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| PSITTACIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Pionopsitta pileata* | cuiú-cuiú | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Pionus maximiliani* | maitaca-verde | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Amazona vinacea* | papagaio-de-peito-roxo | T | F | | G | | x | | EN | VU | VU | | |
| *Amazona aestiva* | papagaio-louro | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Forpus xanthopterygius* | tuim | T | F | | P | | | | | | | Alt | |
| *Pyrrhura frontalis* | tiriba-de-testa-vermelha | T | F | | M | | x | | | | | | |
| PASSERIFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| THAMNOPHILIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Dysithamnus mentalis* | choquinha-lisa | T | F | | M | | | | | | | Alt | |
| *Herpsilochmus rufimarginatus* | chorozinho-de-asa-vermelha | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Thamnophilus ruficapillus* | choca-de-chapéu-vermelho | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Thamnophilus caerulescens* | choca-da-mata | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Batara cinerea* | matracão | T | F | CB | M | | | | | | | | |
| *Mackenziaena leachii* | borralhara-assobiadora | T | F | CB | M | | x | | | | | | |
| *Pyriglena leucoptera* | papa-taoca-do-sul | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Drymophila rubricollis* | trovoada-dublê | T | F | BB | M | | x | | | | | | |
| *Drymophila malura* | choquinha-carijó | T | F | CB | M | | x | | | | | | |
| CONOPOPHAGIDAE | | | | | | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Conopophaga lineata* | chupa-dente | T | F | | M | | x | | | | | | |
| GRALLARIIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Grallaria varia* | tovacuçu | T | F | | G | | | | | | | | |
| *Cryptopezus nattereri* | pinto-do-mato | T | F | | G | | x | | | | | | |
| FORMICARIIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Chamaeza campanisona* | tovaca-campainha | T | F | | G | | | | | | | | |
| *Chamaeza ruficauda* | tovaca-de-rabo-vermelho | T | F | | G | | x | | | | | | |
| SCLERURIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Sclerurus scansor* | vira-folha | T | F | | G | | x | | | | | | |
| DENDROCOLAPTIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Sittasomus griseicapillus* | arapaçu-verde | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Dendrocolaptes platyrostris* | arapaçu-grande | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Xiphocolaptes albicollis* | arapaçu-de-garganta-branca | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Xiphorhynchus fuscus* | arapaçu-rajado | T | F | | G | | | | | | | | |
| *Lepidocolaptes falcinellus* | arapaçu-escamoso-do-sul | T | F | | M | | x | | | | | | |
| XENOPIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Xenops rutilans* | bico-virado-carijó | T | F | | M | | | | | | | | |
| FURNARIIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Furnarius rufus* | joão-de-barro | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Lochmias nematura* | joão-porca | T | F | BR | M | | | | | | | | |
| *Heliobletus contaminatus* | trepadorzinho | T | F | | G | | x | | | | | | |
| *Syndactyla rufosuperciliata* | trepador-quiete | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Dendroma rufa* | limpa-folha-de-testa-baia | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Clibanornis dendrocolaptoides* | cisqueiro | T | F | BR | M | | x | | | | | | |
| *Leptasthenura setaria* | grimpeiro | T | F | | P | | x | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Anumbius annumbi* | cochicho | T | A | | M | | | | | | | | |
| *Cranioleuca obsoleta* | arredio-oliváceo | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Cranioleuca pallida* | arredio-pálido | T | F | | M | x | x | | | | | | |
| *Certhiaxis cinnamomeus* | curutié | T | A | CH | M | | | | | | | | |
| *Synallaxis cinerascens* | pipuí | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Synallaxis ruficapilla* | pichororé | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Synallaxis spixi* | joão-teneném | T | F | | P | | | | | | | | |
| PIPRIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Chiroxiphia caudata* | tangará | T | F | | M | | x | | | | | | |
| COTINGIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Procnias nudicollis* | araponga | T | F | | G | | x | | | | | Alt | |
| TITYRIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Schiffornis virescens* | flautim | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Tityra cayana* | anambé-branco-de-rabo-preto | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Pachyramphus viridis* | caneleiro-verde | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Pachyramphus castaneus* | caneleiro | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Pachyramphus polychopterus* | caneleiro-preto | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Pachyramphus validus* | caneleiro-de-chapéu-preto | T | F | | M | | | | | | | PM | |
| PLATYRINCHIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Platyrinchus mystaceus* | patinho | T | F | | M | | | | | | | | |
| RHYNCHOCYCLIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Mionectes rufiventris* | abre-asa-de-cabeça-cinza | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Leptopogon amaurocephalus* | cabeçudo | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Phylloscartes eximius* | barbudinho | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Phylloscartes ventralis* | borboletinha-do-mato | T | F | | M | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Tolmomyias sulphurescens* | bico-chato-de-orelha-preta | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Todirostrum cinereum* | ferreirinho-relógio | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Poecilotriccus plumbeiceps* | tororó | T | F | CB | M | | | | | | | | |
| *Myiornis auricularis* | muidinho | T | F | | P | | x | | | | | | |
| *Hemitriccus diops* | olho-falso | T | F | BB | M | | x | | | | | | |
| TYRANNIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Hirundinea ferruginea* | gibão-de-couro | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Euscarthmus meloryphus* | barulhento | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Tyranniscus burmeisteri* | piolhinho-chiador | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Camptostoma obsoletum* | risadinha | T | F | | P | | | | | | | Alt | |
| *Elaenia flavogaster* | guaracava-de-barriga-amarela | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Elaenia spectabilis* | guaracava-grande | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Elaenia parvirostris* | tuque-pium | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Elaenia mesoleuca* | tuque | T | F | | P | | x | | | | | PM | |
| *Myiopagis caniceps* | guaracava-cinzenta | T | F | | M | | | | | | | Alt | |
| *Myiopagis viridicata* | guaracava-de-crista-alaranjada | T | F | | M | | | | | | | PM | |
| *Phyllomyias virescens* | piolhinho-verdoso | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Phyllomyias fasciatus* | piolhinho | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Serpophaga nigricans* | joão-pobre | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Serpophaga subcristata* | alegrinho | T | F | | P | | | | | | | VO | |
| *Attila phoenicurus* | capitão-castanho | T | F | | G | | | | | | | | |
| *Legatus leucophaius* | bem-te-vi-pirata | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Myiarchus swainsoni* | irré | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Myiarchus ferox* | maria-cavaleira | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Pitangus sulphuratus* | bem-te-vi | T | G | | P | | | | | | | PM | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Machetornis rixosa* | suiriri-cavaleiro | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Myiodynastes maculatus* | bem-te-vi-rajado | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Megarynchus pitangua* | neinei | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Myiozetetes similis* | bentevizinho-de-penacho-vermelho | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Tyrannus melancholicus* | suiriri | T | G | | P | | | | | | | PM | |
| *Tyrannus savana* | tesourinha | T | G | AG | P | | | | | | | PM | |
| *Empidonomus varius* | peitica-de-chapéu-preto | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Colonia colonus* | viuvinha | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Arundinicola leucocephala* | freirinha | T | A | CH | M | | | | | | | | |
| *Pyrocephalus rubinus* | príncipe | T | G | | P | | | | | | | PM | |
| *Muscipipra vetula* | tesoura-cinzenta | T | F | | M | | x | | | | | Alt | |
| *Myiophobus fasciatus* | filipe | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Cnemotriccus fuscatus* | guaracavuçu | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Lathrotriccus euleri* | enferrujado | T | F | | M | | | | | | | PM | |
| *Contopus cinereus* | papa-moscas-cinzento | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Satrapa icterophrys* | suiriri-pequeno | T | G | | P | | | | | | | Alt | |
| *Knipolegus lophotes* | maria-preta-de-penacho | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Knipolegus cyanirostris* | maria-preta-de-bico-azulado | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Xolmis velatus* | novinha-branca | T | A | | M | | | | | | | | |
| *Nengetus cinereus* | primavera | T | A | | P | | | | | | | | |
| VIREONIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Cyclarhis gujanensis* | pitiguari | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Hylophilus poicilotis* | verdinho-coroado | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Vireo chivi* | juruviara | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| CORVIDAE | | | | | | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Cyanocorax caeruleus* | gralha-azul | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Cyanocorax chrysops* | gralha-picaça | T | F | | P | | | | | | | | |
| HIRUNDINIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Pygochelidon cyanoleuca* | andorinha-pequena-de-casa | V | G | | P | | | | | | | VS | |
| *Alopochelidon fucata* | andorinha-morena | V | A | | M | | | | | | | | |
| *Stelgidopteryx ruficollis* | andorinha-serradora | V | A | AG | P | | | | | | | PM | |
| *Progne tapera* | andorinha-do-campo | V | A | | P | | | | | | | PM | |
| *Progne chalybea* | andorinha-grande | V | G | AG | P | | | | | | | PM | |
| *Tachycineta leucorrhoa* | andorinha-de-sobre-branco | V | A | | P | | | | | | | | |
| *Hirundo rustica* | andorinha-de-bando | V | G | AG | P | | | | | | | VN | |
| *Petrochelidon pyrrhonota* | andorinha-de-dorso-acanelado | V | A | | P | | | | | | | VN | |
| TROGLODYTIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Troglodytes musculus* | corruíra | T | F | | P | | | | | | | | |
| TURDIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Turdus flavipes* | sabiá-una | T | F | | M | | | | | | | Alt | |
| *Turdus leucomelas* | sabiá-barranco | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Turdus rufiventris* | sabiá-laranjeira | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Turdus amaurochalinus* | sabiá-poca | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Turdus subalaris* | sabiá-ferreiro | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Turdus albicollis* | sabiá-coleira | T | F | | M | | | | | | | Alt | |
| MIMIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Mimus saturninus* | sabiá-do-campo | T | G | | P | | | | | | | | |
| ESTRILDIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Estrilda astrild exo* | bico-de-lacre | T | A | | P | | | | | | | | |
| PASSERIDAE | | | | | | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Passer domesticus exo* | pardal | T | G | | P | | | | | | | | |
| MOTACILLIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Anthus chii* | caminheiro-zumbidor | T | A | CL | P | | | | | | | | |
| *Anthus nattereri* | caminheiro-dourado | T | A | | G | | | x | VU | VU | CR | | |
| *Anthus hellmayri* | caminheiro-de-barriga-acanelada | T | A | | P | | | | | | | | |
| FRINGILLIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Spinus magellanicus* | pintassilgo | T | A | | G | | | | | | | Alt | |
| *Cyanophonia cyanocephala* | gaturamo-rei | T | F | | P | | | | | | | Alt | |
| *Chlorophonia cyanea* | gaturamo-bandeira | T | F | | M | | x | | | | | Alt | |
| *Euphonia chlorotica* | fim-fim | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Euphonia chalybea* | cais-cais | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Euphonia violacea* | gaturamo-verdadeiro | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Euphonia pectoralis* | ferro-velho | T | F | | M | | x | | | | | Alt | |
| PASSERELLIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Ammodramus humeralis* | tico-ticodo-campo | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Zonotrichia capensis* | tico-tico | T | G | | P | | | | | | | Alt | |
| ICTERIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Leistes superciliaris* | polícia-inglesa-do-sul | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Cacicus haemorrhous* | guaxe | T | F | NI | P | | | | | | | | |
| *Icterus pyrrhopterus* | encontro | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Molothrus rufoaxillaris* | chupim-azeviche | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Molothrus bonariensis* | chupim | T | F | | P | | | | | | | Alt | |
| *Gnorimopsar chopi* | pássaro-preto | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Pseudoleistes guirahuro* | chupim-do-brejo | T | A | CH | P | | | | | | | | |
| PARULIDAE | | | | | | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Geothlypis aequinoctialis* | pia-cobra | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Setophaga pitiayumi* | mariquita | T | F | | M | | | | | | | Alt | |
| *Myiothlypis leucoblephara* | pula-pula-assobiador | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Basileuterus culicivorus* | pula-pula | T | F | | M | | | | | | | | |
| CARDINALIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Amaurospiza moesta* | negrinho-do-mato | T | F | BB | M | | | | | | | | |
| *Cyanoloxia glaucocaerulea* | azulinho | T | A | | P | | | | | | | PM | |
| *Cyanoloxia brissonii* | azulão | T | G | | M | | | | | | | | |
| THRAUPIDAE | | | | | | | | | | | | | |
| *Embernagra platensis* | sabiá-do-banhado | T | A | CH | P | | | | | | | | |
| *Emberizoides herbicola* | canário-do-campo | T | A | CA | P | | | | | | | | |
| *Emberizoides ypiranganus* | canário-do-brejo | T | A | CH | M | | | | | | | | |
| *Hemithraupis guira* | saíra-de-papo-preto | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Tersina viridis* | saí-andorinha | T | F | | P | | | | | | | PM | |
| *Dacnis cayana* | saí-azul | T | F | | P | | | | | | | Alt | |
| *Saltator similis* | trinca-ferro | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Saltator maxillosus* | bico-grosso | T | F | | M | | x | | | | | Alt | |
| *Coereba flaveola* | cambacica | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Volatinia jacarina* | tiziu | T | A | | P | | | | | | | Alt | |
| *Trichothraupis melanops* | tiê-de-topete | T | F | | M | | | | | | | | |
| *Coryphospingus cucullatus* | tico-tico-rei | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Tachyphonus coronatus* | tiê-preto | T | F | | P | | x | | | | | | |
| *Sporophila plumbea* | patativa | T | A | CA | M | | | x | | | EN | | |
| *Sporophila caerulescens* | coleirinho | T | A | | P | | | | | | | PM | |
| *Sporophila hypoxantha* | caboclinho-de-barriga-vermelha | T | A | CH | G | | | | | VU | VU | PM | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | | BG | | | CONS | | | MIG | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | UH | EH | GS | BR | MA | CS | IUCN | BR | PR | | |
| *Sporophila angolensis* | curió | T | F | | P | | | | | | VU | | |
| *Thlypopsis pyrrhocoma* | cabecinha-castanha | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Donacospiza albifrons* | tico-tico-do-banhado | T | A | CH | P | | | | | | | | |
| *Microspingus cabanisi* | quete-do-sul | T | F | | M | | x | | | | | | |
| *Conirostrum speciosum* | figuinha-de-rabo-castanho | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Sicalis citrina* | canário-rasteiro | T | A | AR | M | | | | | | | | |
| *Sicalis flaveola* | canário-da-terra | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Sicalis luteola* | tipio | T | A | | P | | | | | | | | |
| *Haplospiza unicolor* | cigarra-bambu | T | F | BB | M | | x | | | | | | |
| *Pipraeidea melanonota* | saíra-viúva | T | F | | P | | | | | | | Alt | |
| *Rauenia bonariensis* | sanhaço-papa-laranja | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Stephanophorus diadematus* | sanhaço-frade | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Paroaria coronata* | cardeal | T | G | | P | | | | | | | | |
| *Thraupis sayaca* | sanhaço-cinzento | T | F | | P | | | | | | | | |
| *Stilpnia preciosa* | saíra-preciosa | T | F | | P | | | | | | | | |

**LEGENDA: Indicadores ecológicos (ECO):** TE, tipo ecológico (T, terrestre; D, aquático dulcicola; M, aquático marinho; V, aerícola); UH, uso do habitat (A, espécie de habitats abertos; G, espécie generalista; F, espécie florestal); EH, dependência de habitats ou condições ecológicas particulares (AE, alimentação especializada; AG, grandes agregações uni-específicas sazonais/circadianas; AR, afloramentos rochosos e cavernas; BH, brejos com vegetação herbácea densa; BR, beiras de rios, matas ciliares; BU, buritizais/carnaubais; CA, campo arbustivo; CB, brenhas, cipoais, bromélias; CC, corticícola; CH, campo úmido; CL, campo limpo; HL, habitats lacustres grandes; MS, matas secas; NI, ninhais; PF, praias fluviais). GS – Graus de sensibilidade a antropismos (P, pequena, espécie resiliente; M, média, espécie pouco sensível; G, alta, espécie sensível. **Indicadores biogeográficos (BG):** BR, endêmica do Brasil; MA, endêmica da Mata Atlântica; CS, endêmica dos Campos Sulinos; **Indicadores de conservação (CONS)**: IUCN (âmbito global); BR (âmbito federal); PR (âmbito estadual) nas categorias: CR(PRW), criticamente em Perigo (Possivelmente Extinta na Natureza); CR, Criticamente em Perigo; EN, em perigo; VU, vulnerável; LC, menos preocupante. **Migração (MIG)**: VN, visitante setentrional; VS, visitante meridional; VL, visitante do leste; VO, visitante do oeste); **P12**: mencionadas como migratórias pela Portaria nº12/2018, nos apêndices 1 ou 2.

***Lista de anfíbios e répteis de confirmada ou supositiva ocorrência no Parque Estadual do Monge, com indicadores ecológicos (ECO), biogeográficos (BG) e de conservação (CONS).***

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | CE | CG | IUCN | BR | PR |
| ANFÍBIOS | | | | | | | | | | | |
| ANURA | | | | | | | | | | | |
| BUFONIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Rhinella icterica* | sapo-comum | T, A | TE | FL, BN | | | | | | | |
| *Melanophryniscus sp.* | sapinho-das-bromélias | T | TE | CS | x | | | x | | | |
| ODONTOPHRYNIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Proceratophrys boiei* | sapinho-de-chifres | T, A | SF | FL, BN | | x | | | | | |
| *Proceratophrys brauni* | sapinho-de-chifres | T, A | SF | FL, BN | | | | | | | |
| HYLIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Aplastodiscus perviridis* | perereca-verde | T | ES | MC, RF | | x | | | | | |
| *Dendropsophus minutus* | pererequinha | T, A | ES, AS | BN, MC | | | | | | | |
| *Boana albopunctata* | perereca-cabrinha | T, A | ES, AS | BN | | | | | | | |
| *Boana bischoffi* | perereca | T, A | ES, AS | BN, MC | | x | | | | | |
| *Boana faber* | sapo-ferreiro | T, A | ES, AS | BN, MC | | | | | | | |
| *Boana prasina* | perereca | T, A | ES, AS | BN, MC | | | | | | | |
| *Scinax fuscovarius* | perereca | T, A | ES, AS | BN, MC, FL | | | | | | | |
| *Scinax perereca* | perereca | T, A | ES, AS | BN | | | | | | | |
| *Scinax cf. catharinae* | perereca-das-matas | T | AR | FL | | x | | | | | |
| *Scinax rizibilis* | risadinha | T, A | ES, AS | BN, MC | | | | | | | |
| *Sphaenorhynchus caramaschii* | perereca-limão | T, A | ES, AS | BN | | | | | | | |
| *Sphaenorhynchus surdus* | perereca-limão | T, A | ES, AS | BN | | | | | | | |
| PHYLLOMEDUSIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Phyllomedusa tetraploidea* | perereca-verde | T | ES | BN, MC | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | CE | CG | IUCN | BR | PR |
| LEPTODACTYLIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Adenomera marmorata* | rãzinha-das-matas | T | TE | FL | | x | | | | | |
| *Leptodactylus luctator* | rã-manteiga | T, A | TE, AS | BN, CS | | | | | | | |
| *Leptodactylus fuscus* | rã | T, A | TE, AS | BN, CS | | | | | | | |
| *Leptodactylus gracilis* | rã | T, A | TE, AS | BN | | | | | | | |
| *Leptodactylus notoaktites* | rã-piadeira | T | TE | FL, BN | | x | | | | | |
| *Physalaemus cuvieri* | rã-cachorro | T, A | TE, AS | BN, CS | | | | | | | |
| *Physalaemus gracilis* | rã-chorona | T, A | TE, AS | BN | | | | | | | |
| RÉPTEIS | | | | | | | | | | | |
| TESTUDINES | | | | | | | | | | | |
| CHELIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Acanthochelys spixii* | cágado-preto | T, A | TE, AS | BN, RC | | | | | | | |
| *Hydromedusa tectifera* | cágado-pescoço-de-cobra | T, A | TE, AS | RF, RE, RL | | | | | | | |
| SQUAMATA (LAGARTOS) | | | | | | | | | | | |
| GEKKONIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Hemidactylus mabouia exo* | lagartixa-de-parede | T | ES | FL, CS | | | | | | | |
| POLYCHROTIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Urostrophus grilli* | lagartixa | T | AR, TE | FL | | | | | | | |
| *Urostrophus vautieri* | lagartixa | T | AR, TE | FL | | | | | | | |
| ANGUIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Ophiodes fragilis* | cobra-de-vidro | T | TE | FL, BN | | x | | | | | |
| *Ophiodes sp.* | cobra-de-vidro | T | TE | BN | | | | | | | |
| MABUYIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Aspronema dorsivittatum* | lagartixa-lisa | T | TE | CS | | | | | | | |
| TEIIDAE | | | | | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | CE | CG | IUCN | BR | PR |
| *Salvator merianae* | teiú | T | TE | FL, CS, BN | | | | | | | |
| GYMNOPHTHALMIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Cercosaura schreibersii* | lagartixa-do-campo | T | TE | CS | | | | | | | |
| SQUAMATA (ANFISBENAS) | | | | | | | | | | | |
| AMPHISBAENIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Amphisbaena dubia* | cobra-cega | T | FS | CS | | | | | | | |
| SQUAMATA (SERPENTES) | | | | | | | | | | | |
| ANOMALEPIDIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Liotyphlops ternetzii* | cobra-cega | T | FS | FL, CS | | | | | | | |
| COLUBRIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Chironius bicarinatus* | cobra-cipó | T | AR, TE | FL | | | | | | | |
| *Chironius brazili* | cobra-cipó | T | AR, TE | CS | | | x | | | | |
| DIPSADIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Atractus reticulatus* | cobra-da-terra | T | SF | CS | | | | | | | |
| *Boiruna maculata* | muçurana | T | TE | FL, CS | | | | | | | |
| *Dipsas ventrimaculata* | dormideira | T | TE | FL, CS | | | | | | | |
| *Ditaxodon taeniatus* | cobra-listrada | T | TE | CS | x | | | | VU | VU | VU |
| *Echinanthera cyanopleura* | cobrinha-da-mata | T | TE | FL | | x | | | | | |
| *Erythrolamprus almadensis* | cobra-de-capim | T | TE | CS, BN | | | | | | | |
| *Erythrolamprus jaegeri* | cobra-verde | T | TE | CS, BN | | | | | | | |
| *Erythrolamprus miliaris* | cobra-d'água | T, A | TE, AS | FL, BN, RC | | | | | | | |
| *Erythrolamprus poecilogyrus* | cobra-d'água | T | TE | CS, BN | | | | | | | |
| *Gomesophis brasiliensis* | cobra-do-lodo | T, A | TE, AS | BN, RC | | | | | | | |
| *Helicops infrataeniatus* | cobra-d'água | A | AS | BN, RC | | | | | | | |
| *Lygophis flavifrenatus* | cobra-listrada | T | TE | CS, BN | | | | | | | |

| TÁXONS | NOMES VERNÁCULOS | ECO | | | BG | | | | CONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TE | DES | HE | BR | MA | CE | CG | IUCN | BR | PR |
| *Lygophis meridionalis* | cobra-listrada | T | TE | CS, BN | | | x | | | | |
| *Oxyrhopus clathratus* | coral-falsa | T | TE | FL | | | | | | | |
| *Oxyrhopus rhombifer* | coral-falsa | T | TE | CS, BN | | | | | | | |
| *Philodryas aestiva* | cobra-verde | T | TE, AR | FL | | | | | | | |
| *Philodryas olfersii* | cobra-verde | T | TE, AR | FL | | | | | | | |
| *Pseudablabes patagoniensis* | parelheira, corre-campo | T | TE, ES | CS, BN | | | | | | | |
| *Pseudoboa haasi* | muçurana | T | TE | FL | | x | | | | | |
| *Ptychophis flavovirgatus* | cobra-d'água | T, A | TE, AS | CS, RC | | | | | | | |
| *Dibernardia affinis* | cobrinha-da-mata | T | TE | FL | x | x | | | | | |
| *Dibernardia bilineata* | cobrinha-da-mata | T | TE | FL | x | x | | | | | |
| *Dryophylax nattereri* | cobra-espada | T | TE, ES | FL, MC, BN | | | | | | | |
| *Mesotes strigatus* | cobra-espada | T | TE | FL, MC, BN | | | | | | | |
| *Tomodon dorsatus* | cobra-espada | T | TE | FL, MC | | | | | | | |
| *Xenodon merremii* | boipeva | T | TE | CS, BN | | | | | | | |
| *Xenodon neuwiedii* | boipeva-da-mata | T | TE | FL | | x | | | | | |
| ELAPIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Micrurus altirostris* | coral-verdadeira | T | TE, SF | FL, CS | | | | | | | |
| *Micrurus corallinus* | coral-verdadeira | T | TE, SF | FL | | x | | | | | |
| VIPERIDAE | | | | | | | | | | | |
| *Bothrops alternatus* | urutu | T | TE | CS, BN | | | | | | | |
| *Bothrops jararaca* | jararaca | T | TE, ES | FL, MC | | x | | | | | |
| *Bothrops neuwiedi* | jararaca-pintada | T | TE | FL | | | | | | | |
| *Crotalus durissus* | cascavel | T | TE | CS | | | | | | | |

**Legenda: Indicadores ecológicos (ECO)**: TE, tipo ecológico (T, terrestre; A, aquático); DES, deslocamento (AQ, aquática, AS, semiaquática, ES, escansorial, AR, arborícola, TE, terrícola, SF, semifossorial, FS, fossorial); HE, hábitats especiais (FL: florestas; CS: campos secos; BN: banhados, campos úmidos e várzeas; CE: cerrado; AR: afloramentos rochosos; MC: matas ciliares; RF: riachos e nascentes em ambientes florestais; RC: riachos e nascentes em ambientes abertos; RE: grandes rios encachoeirados e com afloramentos rochosos;

RL: grandes rios com fundos lodosos ou arenosos); **Indicadores biogeográficos (BG)**: BR, endêmica do Brasil; MA, endêmica da Mata Atlântica; CE, endêmica do Cerrado; CG: endêmica dos campos gerais do sul do Brasil; **Indicadores de conservação (CONS):** IUCN (âmbito global); BR (âmbito federal); PR (âmbito estadual) nas categorias: CR(PRW), Criticamente em Perigo (Possivelmente Extinta na Natureza); CR, Criticamente em Perigo; EN, em perigo; VU, vulnerável; NT, quase amaçada; DD, deficiente em dados; LC, menos preocupante. EXO: Espécie exótica.